

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

 **ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995  
Телефон 240 60 15. Телекс 114818 ПДЧ. Факс 243 33 37

Ru04/261

REC'D 23 SEP 2004

WIPO

PCT

Наш № 20/12-456

«13» августа 2004 г.

## СПРАВКА


Федеральный институт промышленной собственности (далее - Институт) настоящим удостоверяет, что приложенные материалы являются точным воспроизведением первоначального заявления, описания, формулы, реферата и чертежей (если имеются) международной заявки № PCT/RU03/00304, поданной в Институт как в Получающее ведомство в соответствии с Договором о патентной кооперации в июле. месяце 14 дня 2003 года (14.07.2003).

## PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

Зам. директора Института

В.Ю.Джермакян



РСТ

## ЗАЯВЛЕНИЕ

Нижеподписавшийся  
просит рассматривать настоящую международную  
заявку в соответствии с Договором о патентной  
кооперации

Заполняется получающим ведомством

РСТ/RU 0 3 / 0 0 3 0 4

Номер международной заявки

14 июля 2003 (14.07.2003)

Дата международной подачи

RO/RU

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЯВКА РСТ

Наименование международной заявки РСТ  
«Международная заявка РСТ»№ дела заявителя или агента  
(по желанию) (максимум 12 знаков)

Графа I	НАЗВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ Способ лечения онкологических; инфекционных и соматических заболеваний, методы контроля эффективности лечения, фармацевтические агенты и композиция для осуществления лечения		
Графа II	ЗАЯВИТЕЛЬ <input checked="" type="checkbox"/> Данное лицо является также изобретателем		
Имя и адрес: (Фамилия указывается перед именем, для юридического лица - полное уставное наименование. Адрес должен включать почтовый индекс и название страны. Если государство местожительства лица не будет указано, то таковым будет считаться страна указанного в данной графе адреса)		Телефон №	
Тец Виктор Вениаминович Россия, 196066, Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, 27 - 95		Телефакс №	
Tets Viktor Veniaminovich RU, 196066, Sankt-Peterburg, ul. Lensoвета, 27 - 95		Телепринтер №	
		Регистрационный № заявителя в Ведомстве	
Государство (т.е. страна) гражданства: RU		Государство (т.е. страна) местожительства: RU	
Данное лицо является заявителем для: <input checked="" type="checkbox"/> всех указанных государств <input type="checkbox"/> всех указанных государств, кроме США <input type="checkbox"/> только США <input type="checkbox"/> государств, указанных в дополнительной графе			
Графа III	ДРУГИЕ ЗАЯВИТЕЛИ И/ИЛИ (ДРУГИЕ) ИЗОБРЕТАТЕЛИ		
Имя и адрес: (Фамилия указывается перед именем, для юридического лица - полное уставное наименование. Адрес должен включать почтовый индекс и название страны. Если государство местожительства лица не будет указано, то таковым будет считаться страна указанного в данной графе адреса)		Данное лицо является:	
Генкин Дмитрий Дмитриевич Россия, 197000, Санкт-Петербург, Константиновский пр., 26 - 2		<input type="checkbox"/> только заявителем:	
Genkin Dmitry Dmitrievich RU, 197000, Sankt-Peterburg, Konstantinovskiy pr., 26 - 2		<input checked="" type="checkbox"/> заявителем и изобретателем	
		<input type="checkbox"/> только изобретателем (если отмечен этот бокс, то ниже заполнять не требуется)	
		Регистрационный № заявителя в Ведомстве	
Государство (т.е. страна) гражданства: RU		Государство (т.е. страна) местожительства: RU	
Данное лицо является заявителем для: <input checked="" type="checkbox"/> всех указанных государств <input type="checkbox"/> всех указанных государств, кроме США <input type="checkbox"/> только США <input type="checkbox"/> государств, указанных в дополнительной графе			
<input checked="" type="checkbox"/> Другие заявители и/или (другие) изобретатели названы на листе продолжения			
Графа IV	АГЕНТ ИЛИ ОБЩИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ; ИЛИ АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ		
Указанное ниже лицо настоящим назначается (назначено) представлять интересы заявителя(ей) в компетентных международных органах в качестве:		<input type="checkbox"/> агента <input type="checkbox"/> общего представителя	
Имя и адрес: (Фамилия указывается перед именем, для юридического лица - полное уставное наименование. Адрес должен включать почтовый индекс и название страны)		Телефон №	
Тец Виктор Вениаминович Россия, 197089, Санкт-Петербург, ул. Л. Толстого, 6/8, Медицинский университет им. Павлова, кафедра микробиологии		Телефакс №	
Tets Viktor Veniaminovich RU, 197089, Sankt-Peterburg, ul. L. Tolstogo, 6/8, Meditsinsky universitet im. Pavlova, kafedra mikrobiologii		Телепринтер №	
		Регистрационный № агента в Ведомстве	
<input checked="" type="checkbox"/> Адрес для переписки: Пометить этот бокс, если агент или общий представитель не назначаются (не назначены), а указанный выше адрес используется только как специальный адрес для переписки		ПОЛУЧЕНО 14 ИЮЛ 2003 ФИПС ОТИ №20	

Лист № 2

<b>Графа III ДРУГИЕ ЗАЯВИТЕЛИ И/ИЛИ (ДРУГИЕ) ИЗОБРЕТАТЕЛИ</b> <i>Если ни одна из следующих подграф не используется, этот лист не включается в заявление</i>	
<p><b>Имя и адрес:</b> (Фамилия указывается перед именем, для юридического лица - полное уставное наименование. Адрес должен включать почтовый индекс и название страны. Если государство местожительства лицу не будет указано, то таковым будет считаться страна указанного в данной графе адреса)</p> <p><b>Тец Георгий Викторович</b>  <b>Россия, 191025, Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, 13 - 41</b></p> <p><b>Tets Georgy Viktorovich</b>  <b>RU, 191025, Sankt-Peterburg, ul. Pushkinskaya, 13 - 41</b></p>	<p><b>Данное лицо является:</b></p> <p><input type="checkbox"/> только заявителем:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> заявителем и изобретателем</p> <p><input type="checkbox"/> только изобретателем (если отмечен этот бокс, то ниже заполнять не требуется)</p> <p><b>Регистрационный № заявителя в Ведомстве</b></p>
<b>Государство (т.е. страна) гражданства:</b> <b>RU</b>	<b>Государство (т.е. страна) местожительства:</b> <b>RU</b>
<p><b>Данное лицо является заявителем для:</b> <input type="checkbox"/> всех указанных государств <input type="checkbox"/> всех указанных государств, кроме США <input checked="" type="checkbox"/> только США <input type="checkbox"/> государств, указанных в дополнительной графе</p>	
<p><b>Имя и адрес:</b> (Фамилия указывается перед именем, для юридического лица - полное уставное наименование. Адрес должен включать почтовый индекс и название страны. Если государство местожительства лицу не будет указано, то таковым будет считаться страна указанного в данной графе адреса)</p>	<p><b>Данное лицо является:</b></p> <p><input type="checkbox"/> только заявителем:</p> <p><input type="checkbox"/> заявителем и изобретателем</p> <p><input type="checkbox"/> только изобретателем (если отмечен этот бокс, то ниже заполнять не требуется)</p> <p><b>Регистрационный № заявителя в Ведомстве</b></p>
<b>Государство (т.е. страна) гражданства:</b>	<b>Государство (т.е. страна) местожительства:</b>
<p><b>Данное лицо является заявителем для:</b> <input type="checkbox"/> всех указанных государств <input type="checkbox"/> всех указанных государств, кроме США <input type="checkbox"/> только США <input type="checkbox"/> государств, указанных в дополнительной графе</p>	
<p><b>Имя и адрес:</b> (Фамилия указывается перед именем, для юридического лица - полное уставное наименование. Адрес должен включать почтовый индекс и название страны. Если государство местожительства лицу не будет указано, то таковым будет считаться страна указанного в данной графе адреса)</p>	<p><b>Данное лицо является:</b></p> <p><input type="checkbox"/> только заявителем:</p> <p><input type="checkbox"/> заявителем и изобретателем</p> <p><input type="checkbox"/> только изобретателем (если отмечен этот бокс, то ниже заполнять не требуется)</p> <p><b>Регистрационный № заявителя в Ведомстве</b></p>
<b>Государство (т.е. страна) гражданства:</b>	<b>Государство (т.е. страна) местожительства:</b>
<p><b>Данное лицо является заявителем для:</b> <input type="checkbox"/> всех указанных государств <input type="checkbox"/> всех указанных государств, кроме США <input type="checkbox"/> только США <input type="checkbox"/> государств, указанных в дополнительной графе</p>	
<p><b>Имя и адрес:</b> (Фамилия указывается перед именем, для юридического лица - полное уставное наименование. Адрес должен включать почтовый индекс и название страны. Если государство местожительства лицу не будет указано, то таковым будет считаться страна указанного в данной графе адреса)</p>	<p><b>Данное лицо является:</b></p> <p><input type="checkbox"/> только заявителем:</p> <p><input type="checkbox"/> заявителем и изобретателем</p> <p><input type="checkbox"/> только изобретателем (если отмечен этот бокс, то ниже заполнять не требуется)</p> <p><b>Регистрационный № заявителя в Ведомстве</b></p>
<b>Государство (т.е. страна) гражданства:</b>	<b>Государство (т.е. страна) местожительства:</b>
<p><b>Данное лицо является заявителем для:</b> <input type="checkbox"/> всех указанных государств <input type="checkbox"/> всех указанных государств, кроме США <input type="checkbox"/> только США <input type="checkbox"/> государств, указанных в дополнительной графе</p>	

☐ Другие заявители и/или (другие) изобретатели названы на другом листе для продолжения

## Графа V УКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВ Пометьте нужные боксы ниже, должен быть отмечен как минимум один бокс

Настоящим делаются следующие указания в соответствии с правилом 4.9(a):

## Региональный патент

- ☐ AP Патент АРIPO: GH Гана, GM Гамбия, KE Кения, LS Лесото, MW Малави, MZ Мозамбик, SD Судан, SL Сьерра-Леоне, SZ Свазиленд, TZ Объединенная Республика Танзания, UG Уганда, ZH Замбия, ZW Зимбабве, а также любое другое государство, являющееся Договаривающимся государством Протокола Хараре и PCT (если испрашивается иной вид охраны или статус, написать на пунктирной линии): .....
- ☒ EA Евразийский патент: AM Армения, AZ Азербайджан, BY Беларусь, KG Кыргызстан, KZ Казахстан, MD Республика Молдова, RU Российская Федерация, TJ Таджикистан, TM Туркменистан, а также любое другое государство, являющееся Договаривающимся государством Евразийской патентной конвенции и PCT
- ☒ EP Европейский патент: AT Австрия, BE Бельгия, CH и LI Швейцария и Лихтенштейн, CY Кипр, DE Германия, DK Дания, ES Испания, FI Финляндия, FR Франция, GB Великобритания, GR Греция, IE Ирландия, IT Италия, LU Люксембург, MC Монако, NL Нидерланды, PT Португалия, SE Швеция, TR Турция, а также любое другое государство, являющееся Договаривающимся государством Европейской патентной конвенции и PCT, SI<sup>1</sup>
- ☐ OA Патент ОАПИ: BF Буркина Фасо, BJ Бенин, CF Центральная Африканская республика, CG Конго, CI Кот д'Ивуар, CM Камерун, GA Габон, GN Гвинея, GQ Экваториальная Гвинея, GW Гвинея-Бисау, ML Мали, MR Мавритания, NE Нигер, SN Сенегал, TD Чад, TG Того а также любое другое государство, являющееся членом ОАПИ и Договаривающимся государством PCT (если испрашивается иной вид охраны или статус, написать на пунктирной линии): .....

RO/RU

Национальный патент (если испрашивается иной вид охраны или статус, написать на пунктирной линии):

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> AE Объединенные Арабские Эмираты             | <input type="checkbox"/> GM Гамбия.....  | <input type="checkbox"/> OM Оман                                    |
| <input type="checkbox"/> AG Антигуа и Барбуда                         | <input checked="" type="checkbox"/> HR Хорватия .....                          | <input type="checkbox"/> NZ Новая Зеландия.....                     |
| <input type="checkbox"/> AL Албания .....                             | <input checked="" type="checkbox"/> HU Венгрия .....                           | <input type="checkbox"/> PH Филиппины .....                         |
| <input type="checkbox"/> AM Армения .....                             | <input type="checkbox"/> ID Индонезия .....                                    | <input type="checkbox"/> PL Польша .....                            |
| <input type="checkbox"/> AT Австрия .....                             | <input checked="" type="checkbox"/> IL Израиль .....                           | <input type="checkbox"/> PT Португалия .....                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> AU Австралия .....                | <input checked="" type="checkbox"/> IN Индия .....                             | <input type="checkbox"/> RO Румыния                                 |
| <input type="checkbox"/> AZ Азербайджан .....                         | <input type="checkbox"/> IS Исландия .....                                     | <input checked="" type="checkbox"/> RU Российская Федерация         |
| <input type="checkbox"/> BA Босния и Герцеговина.....                 | <input checked="" type="checkbox"/> JP Япония .....                            | <input type="checkbox"/> SD Судан                                   |
| <input type="checkbox"/> BB Барбадос .....                            | <input type="checkbox"/> KE Кения .....  | <input type="checkbox"/> SE Швеция                                  |
| <input type="checkbox"/> BG Болгария .....                            | <input type="checkbox"/> KG Кыргызстан .....                                   | <input type="checkbox"/> SG Сингапур .....                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> BR Бразилия.....                  | <input type="checkbox"/> KP Корейская народно-демократическая республика ..... | <input checked="" type="checkbox"/> SI Словения.....                |
| <input type="checkbox"/> BY Беларусь .....                            | <input checked="" type="checkbox"/> KR Республика Корея .....                  | <input type="checkbox"/> SK Словакия .....                          |
| <input type="checkbox"/> BZ Белиз .....                               | <input type="checkbox"/> KZ Казахстан .....                                    | <input type="checkbox"/> SL Сьерра-Леоне .....                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> CA Канада .....                   | <input type="checkbox"/> LC Сент-Люсия .....                                   | <input type="checkbox"/> TJ Таджикистан .....                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> CH and LI Швейцария и Лихтенштейн | <input type="checkbox"/> LK Шри Ланка .....                                    | <input type="checkbox"/> TM Туркменистан .....                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> CN Китай.....                     | <input type="checkbox"/> LR Либерия .....                                      | <input type="checkbox"/> TN Тунис .....                             |
| <input type="checkbox"/> CO Колумбия .....                            | <input type="checkbox"/> LS Лесото .....                                       | <input type="checkbox"/> TR Турция .....                            |
| <input type="checkbox"/> CR Коста Рика .....                          | <input type="checkbox"/> LT Литва .....  | <input type="checkbox"/> TT Тринидад и Тобаго .....                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> CU Куба.....                      | <input type="checkbox"/> LU Люксембург .....                                   | <input type="checkbox"/> TZ Танзания .....                          |
| <input type="checkbox"/> CZ Чешская республика .....                  | <input type="checkbox"/> LV Латвия .....                                       | <input type="checkbox"/> UA Украина.....                            |
| <input type="checkbox"/> DE Германия .....                            | <input type="checkbox"/> MA Марокко .....                                      | <input type="checkbox"/> UG Уганда .....                            |
| <input type="checkbox"/> DK Дания .....                               | <input type="checkbox"/> MD Республика Молдова .....                           | <input checked="" type="checkbox"/> US Соединенные Штаты Америки .. |
| <input type="checkbox"/> DM Доминика .....                            | <input type="checkbox"/> MG Мадагаскар .....                                   | <input type="checkbox"/> UZ Узбекистан.....                         |
| <input type="checkbox"/> DZ Алжир.....                                | <input type="checkbox"/> MK Бывшая Югославская республика Македония.....       | <input type="checkbox"/> VN Вьетнам.....                            |
| <input type="checkbox"/> EC Эквадор .....                             | <input type="checkbox"/> MN Монголия .....                                     | <input checked="" type="checkbox"/> YU Югославия.....               |
| <input type="checkbox"/> EE Эстония .....                             | <input type="checkbox"/> MW Малави .....                                       | <input type="checkbox"/> ZA Южная Африка.....                       |
| <input type="checkbox"/> ES Испания .....                             | <input type="checkbox"/> MX Мексика .....                                      | <input type="checkbox"/> ZH Замбия .....                            |
| <input type="checkbox"/> FI Финляндия .....                           | <input type="checkbox"/> MZ Мозамбик .....                                     | <input type="checkbox"/> ZW Зимбабве.....                           |
| <input type="checkbox"/> GB Великобритания .....                      | <input type="checkbox"/> NO Норвегия .....                                     |   |
| <input type="checkbox"/> GD Гренада .....                             |  |   |
| <input type="checkbox"/> GE Грузия .....                              |  |   |
| <input type="checkbox"/> GH Гана .....                                |  |   |

RO/RU

Боксы, зарезервированные для указания государств, которые стали участниками PCT после выпуска данного листа

- ☐ ..... ☐ ..... ☐ .....
- ☐ ..... ☐ ..... ☐ .....

Упоминание о предварительных указаниях: В дополнение к указаниям, сделанным выше, заявитель, в соответствии с правилом 4.9(b), делает также все указания, допустимые в соответствии с PCT, за исключением указания (указаний), приведенного в Дополнительной графе в качестве исключенных из данного упоминания, и заявляет, что эти дополнительные указания подлежат подтверждению, и что любое указание, не подтвержденное до истечения 15 месяцев с даты приоритета, должно считаться изъятым заявителем на момент истечения этого срока. (Подтверждение (включая оплату пошлины) должно быть представлено в получающее ведомство в пределах 15-месячного срока)

Лист № 4

**Графа VI ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТ**

Настоящим заявляется приоритет следующей предшествующей заявке(ок) :

Дата подачи предшествующей заявки (день/месяц/год)	Номер предшествующей заявки	Если предшествующая заявка является:		
		национальной заявкой: страна	региональной заявкой: региональное ведомство	международной заявкой: получающее ведомство
(1)				
(2)				
(3)				
(4)				
(5)				

☐ Последующие заявления на приоритет указаны в Дополнительной графе

Получающему ведомству поручается подготовить и направить в Международное бюро заверенную копию предшествующей заявки(заявок)(только в том случае, если предшествующая заявка(заявки) была подана в ведомство, которое для настоящей международной заявки является получающим ведомством), указанную выше как:

☐ все ☐ (1) ☐ (2) ☐ (3) ☐ (4) ☐ (5) ☐ другое, см. Дополнительную графу

\*Если предшествующей заявкой является заявка ARIPO, то должна быть указана, по крайней мере, одна страна-участница Парижской конвенции по охране промышленной собственности или одна страна-член Всемирной Торговой Организации, в которую была подана ранняя заявка (правило 4.10(b)(ii)).....

**Графа VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОИСКОВЫЙ ОРГАН**

Выбор международного поискового органа (ISA) (если компетентными в проведении международного поиска являются два или более международных поисковых органа, указать выбранный поисковый орган; можно использовать дробуквенный код):

ISA / RU

Просьба об использовании результатов ранее проведенного поиска; ссылка на такой поиск (если поиск был уже проведен или запрошен у Международного поискового органа ранее):

Дата (день/месяц/год)

Номер

Страна (или региональное ведомство)

**Графа VIII ДЕКЛАРАЦИИ**

Данное заявление содержит следующие декларации (ниже отметить необходимые боксы и указать в правой колонке количество каждого типа деклараций):

Количество деклараций

- ☐ Графа VIII (i) Декларация об удостоверении личности изобретателя :
- ☐ Графа VIII (ii) Декларация о правомочности заявителя на дату международной подачи подавать заявку и получать патент :
- ☐ Графа VIII (iii) Декларация о правомочности заявителя на дату международной подачи на заявление о приоритете в случае, если он не является заявителем, подавшим предшествующую заявку :
- ☐ Графа VIII (iv) Декларация об авторстве на изобретение для целей указания Соединенных Штатов Америки :
- ☐ Графа VIII (v) Декларация о не наносящих ущерб раскрытиях или изъятиях из-за отсутствия новизны :

## Графа IX КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ; ЯЗЫК ПОДАЧИ

Настоящая международная заявка содержит:

- (а) следующее количество листов на бумажном носителе:  
заявление (включая декларацию) : 5  
описание (исключая перечень последовательностей) : 61  
формула : 4  
реферат : 1  
чертежи : 1

Предварительное число листов : 72

часть описания с перечнем последовательностей (действительное число листов, представленных на бумажном носителе, независимо от представления в машиночитаемой форме; см. ниже пункт (b)) : 24

Общее число листов : 96

- (b) перечень последовательностей представлен в машиночитаемой форме

(i) ☐ только (в соответствии с разделом 801(a)(i))

(ii) ☒ как приложение к представленному на бумажном носителе (в соответствии с разделом 801(a)(ii))

Тип и количество носителей (дискета, CD-ROM, CD-R или другое), на котором представлен перечень последовательностей (дополнительно к указанному в пункте 9(ii) в правой колонке): Дискета - 1

К настоящей международной заявке приложены следующие документы (ниже следует отметить соответствующие боксы и указать с права количество приложений каждого вида):

1. ☐ лист расчета пошлин :  
2. ☐ оригинал отдельной доверенности :  
3. ☐ оригинал генеральной доверенности :  
4. ☐ копия генеральной доверенности; ссылка на номер, если имеется :  
5. ☐ разъяснения по поводу отсутствия подписи :  
6. ☐ приоритетный(ые) документ(ы), указанный в графе VI под № :  
7. ☐ перевод международной заявки на (язык) :  
8. ☐ информация о депонировании микроорганизмов или другого биологического материала :  
9. ☐ перечень последовательностей в машиночитаемой форме (указать тип и число носителей (дискета, CD-ROM, CD-R или иное)) :  
(i) ☐ копия, представленная для целей международного поиска в соответствии с правилом 13 ter (и не являющаяся частью международной заявки) :  
(ii) ☐ (только в случае, если слева отмечены боксы (b)(i) или (b)(ii)) дополнительно представленная копия, если допустимо, копия для целей международного поиска в соответствии с правилом 13 ter :  
(iii) ☐ вместе с соответствующим представлением перечня последовательностей, как его заявление отмечено слева :  
10. ☐ иное (указать) :

Кол-во приложений

Фигура чертежей, предлагаемая для публикации с рефератом:

Язык подачи международной заявки:

## Графа X ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ, АГЕНТА ИЛИ ОБЩЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Рядом с каждой подписью указать фамилию каждого подписавшего и указать, в каком качестве он подписал заявление (если это не очевидно из данных, приведенных в заявлении).

Тец В. В.

Геншин Д. Д.

Тец Г. В.

Заполняется получающим ведомством		2. Чертежи: <input checked="" type="checkbox"/> получены: <input type="checkbox"/> не получены:
1. Дата фактического получения международной заявки:	I4 ИЮЛЯ 2003 (I4.07.2003)	
3. Исправленная дата при более позднем, но своевременном получении страниц или чертежей, доукомплектовывающих предполагаемую международную заявку:		
4. Дата своевременного получения требуемых исправлений согласно статье 11(2) PCT:		
5. Международный поисковый орган (если компетентны два и более):	ISA/RU	6. <input type="checkbox"/> Направление копии для поиска задержано впредь до уплаты пошлины за поиск

Заполняется Международным бюро

Дата получения регистрационного экземпляра Международным бюро:

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ, ИНФЕКЦИОННЫХ И  
СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ И  
5 КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ

Область техники

Изобретение относится к медицине и ветеринарии и раскрывает  
новый способ лечения онкологических, инфекционных и  
неинфекционных заболеваний, при котором главной мишенью  
10 терапевтического воздействия является свободно циркулирующая в  
плазме крови (и других жидких средах) больного ДНК, происходящая из  
находящихся в его организме опухолевых, мутантных, или  
инфицированных бактериями, грибами, простейшими клеток, а также из  
различных микроорганизмов. Описаны новые фармацевтические  
15 композиции и методы их применения для лечения онкологических  
заболеваний, инфекционных состояний, вызванных бактериями, грибами  
и простейшими, а так же неинфекционных соматических заболеваний и  
состояний, связанных с накоплением соматических в клетках организма.  
Изобретение описывает лекарственные и иммунологические  
20 композиции, а также сорбционные и физико-химические технологии и  
способы их применения для лечения злокачественных опухолей и  
профилактики их рецидива, а так же лечения инфекций, атеросклероза,  
диабета и для замедления процесса старения. Предложенный способ  
отличается новым принципом действия, повышенной эффективностью  
25 противоопухолевого и противомикробного воздействия и может найти  
применение в терапии онкологических заболеваний, различных  
инфекций и неинфекционных соматических заболеваний.

Предшествующий уровень техники

Популяции опухолевых клеток, развивающиеся в организме больного,  
30 обладают чрезвычайно высокой степенью генетической

изменчивости, намного превышающей таковую у здоровых клеток. Генетическая изменчивость популяций опухолевых клеток позволяет им в процессе заболевания генерировать фенотипы, нечувствительные к иммунному и морфогенетическому контролю, способные к инвазии и метастазированию и нечувствительные к противоопухолевой терапии. Считается, что селекционный отбор и клональная экспансия опухолевых клеток лежат в основе биологической и клинической "прогрессии" опухолей. В соответствии с этими представлениями, стратегия современной противоопухолевой терапии основана на принципе уничтожения клонов опухолевых клеток в организме больного с помощью методов – химиотерапии, радиотерапии, иммунотерапии, хирургического удаления и различных их комбинаций. Все эти методы имеют одну общую фундаментальную особенность – конечной терапевтической мишенью воздействия является опухолевая клетка. Опыт подобной терапии свидетельствует, что вследствие высокой генетической изменчивости опухолевые клетки в основном приобретают нечувствительность к применяемой терапии до того, как используемая методика позволяет их полностью уничтожить.

Существует значительная потребность в новых противоопухолевых лекарствах, менее токсичных, чем большинство из ныне известных. Также имеется потребность в новых противоопухолевых препаратах лекарств, которые могут быть использованы для повышения эффективности ныне известных методов. Аналогично, существует значительная потребность в новых противоопухолевых лекарствах, которые могут быть использованы для снижения токсичности ныне известных методов лечения без уменьшения их эффективности.

Циркуляция молекул ДНК в плазме крови больных онкологическими заболеваниями и здоровых людей описана в ряде работ (P.Anker et al. , Clinica Chimica Acta ,v.313, 2001, pp143-146; Fedorov N.A.

et.al., Bull.Exp.Biol.Med.,v102,1986, pp281-283). Патент (US 5952170) описывает определение ДНК в плазме крови для диагностики и прогнозирования течения онкологических заболеваний Патенты (US 6465177 и US 6156504) описывают использование ДНК плазмы крови  
 5 для определения мутаций в онкогенах и микросателлитных участках генов, изучения геномной нестабильности в опухолях и использования результатов наблюдений для диагностики, мониторингирования и прогнозирования течения заболевания.

Sugihara S . et al.(1990, 1993) изучали влияние ферментов альфа  
 10 химотрипсина и дезоксирибонуклеазы I (ДНКазы I) на аутологичную и гетерологичную адгезию опухолевых клеток при метастазировании. Ими показано, что системное введение ДНКазы I приводит к замедлению роста метастазов. Однако выявленный эффект оказался недостаточным. Авторы делают вывод, что ДНКазы I может быть использована вместе с  
 15 хирургическим удалением опухоли для предотвращения гематогенного метастазирования. Идея авторов заключалась в воздействии на цитоплазматическую мембрану опухолевых клеток и не включала разрушения свободно циркулирующей ДНК. Использованные режим и дозы не могли вызвать продолжительного снижения уровня  
 20 циркулирующей ДНК.

Torchilin V.P. (2001), Патент US 5,780,033, заявляет использование аутоантител, способных связываться с цитоплазматическими и ядерными мембранами опухолевых клеток, и с протеин-ДНК комплексом, происходящим из мертвых опухолевых  
 25 клеток. Из текста заявки видно, что речь идет именно об антителах против белковых антигенных детерминант. В нашем случае используются анти-ДНК антитела и анти-ДНК абзимы. Кроме того, заявленная авторами терапия направлена против фагоцитоза нуклеосом на поверхности опухолевых клеток, что исключает формирование

адекватных терапевтических режимов, необходимых для связывания и выведения из циркуляции ДНК, находящейся в плазме.

Практически нет данных о циркуляции в крови бактериальной ДНК. В организме человека все микробы существуют в составе сообществ-биопленок (Davey M.E. Ootole G.A. 2000. Microbial biofilms: from ecology to Molecular genetics. Microbiol. Mol.Genet. 64:847-867). Биопленки образованы микробными клетками, объединенными с помощью внеклеточного матрикса (Tetz V.V. 1999. Formation and structure of mixed bacterial communities. APMIS, 107:645-654). В составе матрикса биопленок нами обнаружена внеклеточная ДНК, попадающая туда из живых клеток. Наши данные свидетельствуют также, что бактериальная ДНК присутствует в плазме крови инфицированного человека, а её количество и состав могут изменяться при развитии определенных инфекций. Известно, что ДНК может попадать в окружающую среду также при гибели клеток, например в очаге воспаления. При этом, будучи полимером, ДНК значительно повышает вязкость материала (секрета), что негативно сказывается на течении заболевания, затрудняет удаление патогенов, токсинов, разрушенных клеток и т.д. Известен лечебный препарат (Gentech –Roch) "Pulmosime", представляющий собой альфа-ДНК-азу, которая вводится ингаляционно, при лечении муковисцидоза. Эффект действия связан с местным разжижением секрета и не имеет отношения к нарушению транспорта генетической информации этими молекулами ДНК.

Систематический анализ спектра ДНК из крови людей и животных отсутствует. Данные исследований ДНК плазмы крови без проведения ПЦР в печати не обнаружены. Использование ПЦР может сильно исказить состав ДНК плазмы в силу специфичности праймеров, применяемых для амплификации. В связи с этим до последнего времени генетический анализ ДНК плазмы, проводился в основном при помощи

ПЦР или блот-гибридизации, и был направлен на изучение изменений в определённых участках генома (например в микростателлитах и отдельных генах) при опухолевом процессе ( Sanchez-Cespedes M., et al., Ann Oncol, 1998, v9(1), pp113-116; Sozzi G., et al., Clin Can Res, 1999, v5(10), pp2689-2692; Chen X.Q., et al., Nat Med, 1996, v2(9), pp1033-1035).

Таким образом, отсутствуют знания о генетическом репертуаре ДНК, циркулирующей в плазме крови больных при онкопатологии, инфекциях, соматической патологии и у здоровых людей, ее биологической роли и возможном терапевтическом эффекте ее уничтожения или инактивации для лечения этих заболеваний.

#### Раскрытие изобретения

В результате работы над изобретением неожиданно было обнаружено, что ДНК, свободно циркулирующая в плазме крови онкологических больных, содержит уникальный по своему качественному и количественному составу репертуар генов и регуляторных генетических элементов, резко отличающийся от репертуара ДНК, описанного в геноме человека. ДНК плазмы крови онкологических больных содержит в основном уникальные гены человека, включая гены, ассоциированные с поддержанием и формированием «злокачественного» фенотипа. Показано, что ДНК плазмы крови онкологических больных участвует в межклеточном переносе генетической информации внутри популяции опухолевых клеток в организме больного. Настоящее изобретение раскрывает методы уничтожения или инактивации свободно циркулирующей в плазме ДНК, что приводит к подавлению развития раковой опухоли в организме. Изобретение так же включает в себя метод идентификации новых геномных последовательностей, вовлеченных в прогрессию опухолей и в функционирование генома человека. Этот аспект изобретения связан с

выделением, клонированием и секвенированием образцов ДНК из плазмы крови онкологических больных и здоровых людей.

Обнаружено, что различные бактерии выделяют ДНК в матрикс биопленок, и она попадает в кровь и тканевую жидкость в организме человека и животных. Установлено, что наличие внеклеточной ДНК является одним из условий развития микробной инфекции.

Изобретение включает в себя уничтожение и(или) инактивацию циркулирующей микробной ДНК как метода лечения и профилактики, вызываемых ими заболеваний.

Также было обнаружено, что ДНК циркулирующая в крови здоровых людей играет существенную роль в развитии соматического мозаицизма, а ее связывание, разрушение или инактивация подавляют развитие соматического мозаицизма. Связывание, разрушение или инактивация ДНК, циркулирующей в плазме крови дает леченый эффект при заболеваниях, связанных с развитием соматического мозаицизма

Один аспект изобретения раскрывает фармацевтические композиции и нефармацевтические методы уничтожения или инактивации свободно циркулирующей ДНК в плазме крови больных при онкопатологии и инфекциях.

Другой аспект изобретения раскрывает способ лечения больных при онкопатологии, инфекциях, соматических заболеваниях и для продления жизни, связанный с введением им фармацевтических композиций или применением нефармацевтических методов, приводящих к уничтожению или инактивации свободно циркулирующей в плазме ДНК.

Еще один аспект изобретения раскрывает способ контроля эффективности лечения, направленного на уничтожение или инактивацию свободно циркулирующей в плазме ДНК, включающий мониторинг содержания ДНК в плазме крови и определение

наличия в ней опухолеспецифических или микробных генетических маркеров.

Описаны также способы лечения больных при онкопатологии и инфекциях, связанные с введением им фармацевтических композиций или применением нефармацевтических методов, приводящих к  
5 уничтожению или инаktivации свободно циркулирующей в плазме ДНК, когда подобное лечение сочетается с применением стандартных методов противоопухолевой или противомикробной терапии.

Генетическая изменчивость раковых клеток, позволяющая  
10 популяции раковых клеток быстро накапливать и поддерживать признаки, формирующие злокачественный «фенотип», проявляется на генном и хромосомном уровнях потерей, приобретением или изменением последовательностей ДНК – от единичных нуклеотидов до целых хромосом. (Loeb K.R. Carcinogenesis, v21,2000,pp.379-385).  
15 Источником подобной изменчивости считается особый *modus operandi* генетического аппарата раковой клетки - значительно повышенная частота спонтанной мутационной изменчивости на фоне сниженной активности репарационных механизмов и отключения систем контроля генетического гомеостаза (Schmutte C., et al., Anticancer Res., 1999, v19, pp.4665-4696).  
20 Считается, что «мутаторный» фенотип раковых клеток (Loeb L.A., Cancer Research, 2001, v61, pp.3230-3239), свойственная клонам раковых клеток динамическая гетерогенность (Heppner G.H. et al., International Review of Cytology, 1998, v177, pp.1-56) и многочисленные повторяющиеся раунды селекции раковых клонов в процессе прогрессии  
25 опухоли (Cahill D.P. et al., Trends in Cell Biology, v9, pp.M57-M60 ; Rubin H., Adv Cancer Res, 2001, v83, pp.159-207; P. Nowell, Seminars in Cancer Biology, v 12, 2002, pp.261-266) приводят в конечном итоге к селекции и последующей экспансии наиболее злокачественного ракового клона. В соответствии с этими имеющимися знаниями современные методы

лечения злокачественных новообразований построены на принципе уничтожения опухолевых клеток в организме больного.

В процессе исследований было неожиданно обнаружено, что накопление генетических изменений, необходимых для формирования «злокачественного фенотипа» клинически продвинутой раковой опухоли является следствием кооперативного межклонального взаимодействия внутри популяции раковых клеток в организме больного, связанного с горизонтальным переносом генетической информации.

Мессенджером подобного кооперативного взаимодействия является свободно циркулирующая в плазме крови опухолевых больных ДНК, осуществляющая внутрипопуляционный межклональный перенос генов, участвующих в формировании «злокачественного фенотипа» популяции.

Разрушение или инактивация свободно циркулирующей в плазме ДНК приведет к тому, что популяция опухолевых клеток в организме не может поддерживать необходимый уровень генетической изменчивости и теряет способность поддерживать «злокачественный фенотип» (рост, метастазирование, нечувствительность к терапии). Подобное вмешательство имеет как самостоятельную терапевтическую ценность, так и повышает эффективность традиционных методов терапии.

#### Краткий перечень иллюстраций

Фиг.1 Результаты иммуногистохимического окрашивания гистологических срезов опухоли мышей получавших 5 дневный курс терапии Доксорубицином (2мг/кг ежедневно внутривенно) и I (0,5 мг/кг; четыре раза в день на протяжении 5 дней).

А - доксорубицин + ДНКаз

В - доксирубицин

Лучший вариант осуществления изобретения.

Выделение свободно циркулирующей ДНК из плазмы крови.

Свежую (не более 3-4 часов после забора) плазму крови с добавленным антикоагулянтом (цитрат натрия) откручивали на подушке из Ficoll-PlaquePlus( Amersham-Pharmacia) при 1500g 20 минут при комнатной температуре. Плазму (1/2 от всего количества) аккуратно отбирали, не  
5 задевая остаток клеток на подушке фиколла и откручивали при 10 000 g 30 минут чтобы избавиться от обломков клеток и дебриса. Супернатант отбирали, не затрагивая осадок, добавляли до 1% саркозила, до 50мМ трис-HCl, pH 7,6, до 20 мМ ЭДТА, до 400 мМ NaCl, и равный объем смеси фенол-хлороформ 1:1. Полученную эмульсию инкубировали при  
10 65°C 2 часа, затем отделяли фенол-хлороформ центрифугированием при 5000g в течении 20 минут при комнатной температуре. Процедуру депротеинизации фенол-хлороформом повторяли идентичным способом трижды, после чего водную фазу обрабатывали хлороформом, затем диэтиловым эфиром. Отделение от органических растворителей  
15 производили центрифугированием при 5000g в течении 15 минут. К полученной водной фазе добавляли равный объем изопропанола и инкубировали в течение ночи при 0°C. После осаждения нуклеиновые кислоты отделяли центрифугированием при 0°C, 10000g в течении 30 минут. Осадок нуклеиновых кислот растворяли в буфере, содержащем  
20 10мМ трис-HCl , pH 7,6, 5 мМ ЭДТА, и наносили на подушку из ступенчатого хлористого цезия ( 1М, 2.5М, 5.7М) в центрифужной пробирке для ротора SW60Ti. Объем ДНК составлял 2 мл, объем каждой ступеньки CsCl – по 1 мл. Ультрацентрифугирование проводили в приборе L80-80 (Beckman) 3 часа при 250000 g. ДНК отбирали с  
25 поверхности ступеньки 5.7М по фракциям. Фракции диализировали 12 часов. Будет добавлено мМ трис-HCl, pH 7,6, 1мМ ЭДТА при 4°C. Наличие ДНК во фракциях определяли агарозным электрофорезом, с визуализацией ДНК бромистым этидием. Количество ДНК определяли спектрофотометрически (Beckman DU70) в кювете объемом 100мкл,

снимая спектр от 220 до 320 нм. Средний выход ДНК в расчете на 1 мл плазмы составлял 10-20 нг.

#### Клонирование и секвенирование ДНК плазмы крови

Нами был разработан новый метод выделения и клонирования ДНК из плазмы крови, позволяющий конструировать неамплифицированные плазмидные библиотеки такой ДНК с представительностью до миллиона клонов со средним размером в 300-500 пар оснований из 50 мл крови даже с учётом существенного присутствия в плазме различных больных повышенного уровня липополисахаридов и неидентифицированных примесей, существенно затрудняющих очистку нуклеиновых кислот. Таким образом, репрезентативный анализ можно проводить и с меньшими количествами образца плазмы – 10-20 мл в зависимости от присутствия патологических контаминантов. Выделенная по ранее описанному протоколу ДНК была подвергнута дополнительной тщательной депротеинизации с применением протеиназы К (Sigma) при 65°C для удаления прочно связанных белков. После депротеинизации и однократной обработки фенол-хлороформом при 65°C, ДНК осаждали 2,5 объемами этанола в течение ночи. Затем ДНК либо обрабатывали рестриктазой EcoRI в течение 3 часов, либо Pfu полимеразой (Stratagene) в присутствии 300 мкМ всех дезоксинуклеотидтрифосфатов для удаления «липких» концов. Достроенную ДНК фосфорилировали полинуклеотидкиназой T4 (30U, 2 ч.). Полученные препараты лигировали в плазмиду pBluescript (Stratagene), переваренную EcoRI или PvuII соответственно, и десфосфорилированную щелочной фосфатазой CIP (Fermentas) в течение 1 часа. Для лигирования обычно использовали 1 мкг вектора и 0,1-0,5 мкг сывороточной ДНК. Лигирование проводили при помощи Rapid Ligation Kit (Roche) 10 часов при 16°C. Объем лигазной смеси составлял 50 мкл. Лигированную библиотеку трансформировали в клетки DH12S

(Life Technologies) с применением электропоратора (BioRad). Для трансформации одной библиотеки использовали 12-20 электропорационных кювет. Для контроля на чашки с 1,5% агаром и средой LB, содержащей 100мкг/мл ампициллина высевали разведения библиотеки  $10^{-4}$ ,  $10^{-5}$  и  $10^{-6}$ . В обоих случаях представительность библиотеки составляла примерно  $2-3 \times 10^6$  клонов. Теоретически, набор последовательностей ДНК, циркулирующих в плазме, должен соответствовать набору последовательностей ДНК генома. Апоптоз клеток в норме сопровождается практически количественной и неспецифической деградацией ДНК до её выхода из клетки, поэтому в плазме должны быть представлены наиболее часто встречающаяся ДНК – повторяющиеся элементы генома в пропорции соответствующей неспецифической деградации ДНК. К таким элементам относятся L1 повторы, сателлитная ДНК, повторы Alu, MER, MIR, TNE, и некоторые другие. Количество уникальных последовательностей должно быть невелико, в соответствии с их малым процентом в геноме человека и может не детектироваться без ПЦР в клонированной ДНК. Библиотека ДНК плазмы крови больного раком в клинически продвинутой стадии.

Мы сконструировали библиотеку ДНК плазмы крови пациента с диагностированной мезотелиомой в поздней стадии. Представительность библиотеки составила около  $8.5 \times 10^5$  клонов, что вполне удовлетворительно, учитывая весьма небольшое (около  $5 \mu\text{g}$ ) количество ДНК, полученной после очистки от нехарактерных для здорового донора липополисахаридов, присутствовавших в плазме в сверхвысокой концентрации. Анализ 96 клонов длиной от 300 до 1000 пар оснований дал в высшей степени неожиданный результат. (Здесь следует отметить, что только один из проанализированных клонов не был идентифицирован, как человеческая ДНК, для остальных из

HumanGenBank была получена соответствующая информация, идентифицирующая ДНК этих клонов, как ДНК человека). Как указывалось выше, из имеющихся в литературе данных, логично было бы предположить значительную представленность в образцах ДНК

5 высокоповторяющихся элементов. Однако, по меньшей мере 55 из 96 клонов представляют уникальные последовательности ДНК человека. Учитывая реальное соотношение повторяющихся и уникальных элементов генома человека (примерно 95% к 5%) этот результат свидетельствует о том, что репертуар ДНК плазмы данного пациента

10 крайне отличен от состава ДНК в геноме. В данном случае наблюдается резкое обогащение препарата уникальными фрагментами ДНК.

Из 55 фрагментов уникальной ДНК, идентифицированных при секвенировании 96 клонов из библиотеки ДНК плазмы больного функция или продукт соответствующего гена были идентифицированы

15 для 15 последовательностей. Таблицы 1- 15 приводят перечень этих последовательностей и информацию об их участии в формировании и поддержании злокачественного фенотипа.

Таблица 1

Клон	Продукт	Участие в онкогенезе	Источник
Клон 24	Семейство рецепторных белков, связанных с G белком .	Ключевая роль в регуляции жизнедеятельности раковых клеток. Функционирование связано с клеточной трансформацией, подавлением апоптоза, нечувствительностью к гормонам и метастазированием	Steeg P.S. ,Nat Rew Cancer,2003,v.3, pp.55-63. Raj G.V. ,J Urology, 2002,v.167, pp.1458-1463. Hoff A.O., Neoplasia,1999 v.1, pp.485-491.

Таблица 2

Клон	Продукт	Участие в онкогенезе	Источник
Клон 43	Snf2-связанный CBP активатор (SCRAP)	Транскрипционный активатор. Гомологи связаны с развитием синовиальной саркомы и лейкемии.	Thaete C., Hum Mol Genet, 1999, v.8, pp.5 85-91. Monroy M.A., J Biol Chem, 2001, v.276, pp.40721-40726 Lee D.W., Cancer Res., 2000, v.60, pp.3612-3622.

Таблица 3

Клон	Продукт	Участие в онкогенезе	Источник
Клон 51	SRY-box содержащий ген	Транскрипционный модулятор . Экспрессируется в эмбриогенезе. Гомологи связаны с медуллобластомами, опухольями гонад, высокометастатическо й меланомой.	Graham J.D., J Mol endocrinol, 1999, v.22, pp.295- 304. Lee C.J., J Neurooncol, 2002, v.57, pp.201- 214. Uehara S., Cancer Genet Cytogenet, 1999, v.11 3., pp.78-84. Tani M., Genomics, 1997, v.39, pp.30-37

Таблица 4

Клон	Продукт	Участие в онкогенезе	Источник
Клон 72	Тирозин-киназа	Гомологи играют ключевую роль в клеточной регуляцией при раке. Ряд тирозинкиназ является продуктом клеточных онкогенов.	Hunter T. , Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci, 1998,v.353.,pp.583-605. Scheijen B.,Oncogene, 2002,v.21.,pp.3314-3333.

Таблица 5

Клон	Продукт	Участие в онкогенезе	Источник
Клон 83	Fibroblast activation protein alpha; сериновая протеаза, связанная поверхностной мембраной.	Гомологи играют важную роль в инвазии и метастазировании раковых клеток. FAP активен в строме раковых опухолей и присутствует в карциномах различного происхождения.	Chen W.T, Enzyme Protein,1996,v.49.,p p.59-71. Scanlan M.J.,Proc Nat Acad Sci USA, 1994, v.91,pp.5657-5661. Mathew S., Genomics, 1995,v.25,pp.335-337.

Таблица 6

Клон	Продукт	Участие в онкогенезе	Источник
Клон 86	Brain testican	Протеогликан с неизвестной функцией.  Связан со злокачественным фенотипом эмбриональной рабдомиосаркомы.	Genini M., Int J Cancer, 1996, v.66, pp.571- 577.

Таблица 7

Клон	Продукт	Участие в онкогенезе	Источник
Клон 152	KRAB domain, Zn-finger proteins	Гомологи известны как транскрипционные репрессоры. Экспрессия наблюдается в раннем эмбриогенезе,  в клетках нейробластомы, Ewing саркоме, Т-клеточной лимфоме, в процессе прогрессии и приобретении лекарственной устойчивости при раке легкого.	Oguri T., Gene, 1998, v.222, pp.61-67. Gou D.M., Biochim Biophys Acta, 2001, v.1518, pp.306-310 Margolin J.F., Proc Nat Acad Sci USA, 1994, v/91, pp.4509-4513. Bellefroid E.J., EMBO J, 1993, v.12, pp.1363- 1374. Gonzales-Lamuno D., Pediatr Pathol Mol Med, 2002, v.21, pp.531- 540. Marilee J.W., Gene, 1994, v.152, pp.227- 232.

Таблица 8

Клон	Продукт	Участие в онкогенезе	Источник
Клон 190	Антиген, связанный с меланомой	Антиген, узнаваемый аутологичными инфильтрирующими опухоль лимфоцитами	J.Immunol.166(4),2871 -2877,2001

Таблица 9

Клон	Продукт	Участие в онкогенезе	Источник
Клон 167	N-cadherin	Участвует в процессах клеточной адгезии. Играет важную роль в процессах роста инвазии и метастазирования раковых клеток.	Hazan R.B.,J Cell Biol, 2000,v.148,pp.779-790. Li G.,Cancer Res, 2001,v.61,pp.3819- 3825. Tran N.L.,J Biol Chem, 2002,v.277,pp.32905- 32914.

Таблица 10

Клон	Продукт	Участие в онкогенезе	Источник
Клон 197	FAF1: Fas associated factor 1	Фосфопротеин известный как проапоптотический фактор.	Jensen H.H.,Int J Biochem Cell Biol, 2001,v.33,pp.577-589. Ryu S.W.,Biochem Biophys Res Commun, 2001,v.286,pp.1027- 1032.

Таблица 11

Клон	Продукт	Участие в онкогенезе	Источник
Клон 114	Интерлейкин-7	Цитокин. Предполагается, что он является необходимым паракринным-аутокринным фактором роста для многих типов рака..	Trinder P., Int J Oncol, 1999,v.14,pp.23-31. Cosenza L.,Cell Signalling, 2002,v.14,pp.317-325.

Таблица 12

Клон	Продукт	Участие в онкогенезе	Источник
Клон 208	DEAD Box RNA helicase – like protein	Гомологи связаны с метаболизмом РНК. Экспрессируются в пролиферирующих раковых клетках.	Iggo R.D.,Mol Cell Biol, 1991,v.11,pp.1326-1333. Causevic M.,Oncogene, 2001,v.20,pp.7734-7743.

Таблица 13

Клон	Продукт	Участие в онкогенезе	Источник
Клон 97	Lipin 1	Один из регуляторов ответа раковых клеток на цитотоксические препараты.	Brachat A. et.al. ,Oncogene, 2002,v.21,pp.8361-8371

Таблица 14

Клон	Продукт	Участие в онкогенезе	Источник
Клон 121	Dynein	Принимает участие в транспорте белка p53, гиперэкспрессирован при раке простаты и гепатоцеллюлярном раке.	Bull J.H., et.al., Br J Cancer, 2001, v.84, pp.1512-1519. Giannakakou P., et.al., Nat Cell Biol, 2000, v.2, pp.709-717 Jiang J., et.al., Gene, 2001, v.281, pp.103-113.

Таблица 15

Клон	Продукт	Участие в онкогенезе	Источник
Клон 178	Белок Ramp	Связан с развитием клеток человеческой эмбриональной карциномы.	Cheung W.M., et.al., J Biol Chem, 2001, v.276, pp.17083-17091

Таким образом, из 15 последовательностей с идентифицированной функций или продуктом, кодирующих самые разнообразные продукты (протеинкиназы, ростовые факторы, протеиназа, регуляторные ядерные белки, адгезионные молекулы), 14 описаны в литературе, как имеющие отношение к формированию и поддержанию злокачественного фенотипа. Лишь продукт клона 197, идентифицированный как проапоптотический фактор, формально не установлен как фактор, связанный со злокачественной прогрессией. Однако, ряд литературных данных свидетельствует о возможной связи высокого индекса апоптотической активности раковой опухоли с ее прогрессией (Nishimura R., et al., J Surg Oncol, 1999, v.71, pp.226-234.) и о возможной роли факторов.

индуцирующих апоптоз, в формировании и поддержании иммуносупрессии при злокачественном росте (O'Connel J., et al., Dis Esophagus, 1999, v.12, pp.83-89).

Наиболее представленной из повторяющихся элементов в данном препарате оказалась альфа-сателлитная ДНК (30 клонов). Можно сказать, что по отношению к другим секвенированным последовательностям, альфа-сателлитная ДНК оказалась единственным высокоповторяющимся элементом генома человека, ведущим себя в составе данного образца, именно как повтор. Остальные высокоповторяющиеся элементы либо присутствовали в виде одного или нескольких клонов (вариант L1, и MLT2b), либо не обнаружены среди проанализированных образцов (MER, Alu, TNE, MIR,  $\beta$ -сателлиты). Если исходить из имеющихся знаний, что состав ДНК плазмы должен в основном повторять состав ДНК генома, то перечисленные повторы должны были быть представлены в подавляющем числе клонов, в то время как уникальные и умеренно повторяющиеся последовательности вообще не должны обнаруживаться при анализе столь малого числа клонов ДНК. Полученный результат ясно свидетельствует об особом пути образования ДНК плазмы у ракового больного. На это указывает и другой неожиданный результат проведенного анализа - обнаружение в данном препарате фрагментов сразу двух новых умеренно повторяющихся последовательностей неизвестного до недавнего времени типа - дубликонов. Дубликоны были впервые обнаружены в геноме человека менее двух лет назад. Известные дубликоны (Eichler E.E., et al., Genome Res, 1998, v8, pp.791-808; Ji Y., et al., Genome Res, 2000, v.10, pp.597-610; Pujana M.A., et al., Genome Res, 2001, v.11, pp.98-111) - значительные по размеру участки ДНК, размноженные в числе нескольких копий преимущественно в рамках какой-то одной хромосомы (в отличие от других повторов, которые достаточно

равномерно распределены по геному). Образование и экспансию дупликонов сейчас связывают и с различными генетическими синдромами (например с синдромом Прадера-Вилли/Ангельмана, и с эволюцией мультигенных семейств, таких как МНС (Shiina T., et al., Proc Nat Acad Sci USA, 1999, v.96, pp.13282-13287), и с хромосомной нестабильностью в опухолях.

Следует отметить, что анализ клонов из ДНК плазмы крови больного дал следующие неожиданные результаты.

ДНК плазмы крови больного раком высокообогатена уникальными генами. Из 96 проанализированных клонов 55 клонов содержат фрагменты уникальных генов человеческого генома. Из 15 последовательностей с известной функцией, идентифицированных в библиотеке, 14 генов имеют отношение к процессам прогрессии опухолей и поддержанию злокачественного фенотипа.

В препарате ДНК плазмы обнаружено резкое обеднение по наиболее распространённым повторам человека, таким как MER, Alu, TNE, MIR,  $\beta$ -сателлиты.

Весьма важным результатом является обнаружение в препарате двух последовательностей с характеристиками ранее не известных дупликонов, что свидетельствует о представленности дупликонов в подобных образцах ДНК.

Библиотека ДНК плазмы крови здорового донора

Для подтверждения ценности метода клонирования и секвенирования ДНК плазмы крови для идентификации уникальных генетических последовательностей генома, мы сконструировали библиотеку ДНК плазмы крови здорового донора. Известно, что плазма клинически здоровых людей так же содержит ДНК, правда в значительно меньшем количестве, чем плазма раковых больных (Shapiro B., et al.,

Cancer, 1983, v.51, pp.2116-2120). Представительность библиотеки составила около  $8 \times 10^5$  клонов.

Анализ 70 клонов длиной от 300 до 1000 пар оснований дал еще более интересный результат. Из 70 проанализированных клонов 58 представляют собой уникальные последовательности ДНК генома человека. Из них по данным HumanGenBank лишь для 14 определена функция или продукт соответствующего гена.

Всего 12 клонов содержали фрагменты повторяющихся последовательностей, при этом без предпочтения в отношении альфа сателитной ДНК.

Таким образом, неожиданно установлено, что ДНК плазмы крови здорового и больного раком содержит в основном уникальные фрагменты генома человека. При онкологической патологии уникальные последовательности ДНК из плазмы крови соответствуют генам, продукты которых участвуют в формировании злокачественного «фенотипа» опухолевых клеток.

Основываясь на этом нашем неожиданном открытии, мы предположили, что ДНК циркулирующая в плазме крови больных может являться мессенджером горизонтального переноса генетической информации при опухолевых заболеваниях, способствуя накоплению и распространению в популяции опухолевых клеток генов, необходимых для формирования и поддержания «злокачественного фенотипа».

Соматический мозаицизм — состояние являющееся следствием присутствия в организме генетически неидентичных популяций соматических клеток. По современным представлениям, многие неопухолевые и неинфекционные (т.н. соматические) заболевания человека (например диабет, атеросклероз, хронические неспецифические заболевания легких и другие), в том числе и процесс старения человека, связывают с появлением и распространением (экспансией) в процессе

развития индивидуума клонов соматических клеток, несущих «мутантные» гены. (Youssoufian H., et al., Nature Rew. Genet., 2002,v.3,pp.748-758; J.Vijg, Mutation Res.,2000,v.447,pp.117-135; R.Erickson, Mutation Res.,2003,v.543,pp.125-136; Andreassi M.,Mutation Res.,2003,v.543,pp.67-86;Anderson G., et al., Trends in Pharmacological Sci.,2003.,v.24,pp.71-76). Ярким примером подобного процесса служит прогрессия митохондриальной гетероплазмы (экспансия мутантной митохондриальной ДНК) при различных заболеваниях и в процессе старения (E.Jazin et al., Proc Nat Acad Sci USA, 1996, v.93,pp.12382-12387; Michikawa Y. Et al.,Science,1999,v.286,pp.774-779; Calloway C. Et al.,Am J Hum Gen,2000,v.66,pp.1384-1397).

В качестве двух альтернативных моделей возникновения соматического мозаицизма рассматривают возможность появления множественных мутаций «de novo» в поликлональной клеточном пуле либо клональную экспансию мутантного клона клеток (Khrapko K., et al., Mutation Res.,2003,v.522,pp.13-19).

В процессе работы над изобретением нами обнаружено, что ДНК циркулирующая в крови здоровых людей играет существенную роль в развитии соматического мозаицизма, а ее связывание, разрушение или инактивация подавляют развитие соматического мозаицизма. Связывание, разрушение или инактивация ДНК, циркулирующего в плазме крови дает леченый эффект при заболеваниях, связанных с развитием соматического мозаицизма.

Приведенные ниже примеры показывают роль ДНК, циркулирующей в плазме крови больных в развитии нечувствительности опухолей к химиотерапии, развитии метастатического процесса при развитии сепсиса и ряде других патологических состояний. Обнаружен высокий терапевтический эффект от уничтожения, связывания или инактивации ДНК плазмы крови.

## Роль свободно циркулирующей ДНК в прогрессии опухолей

### Материалы и методы.

Использовалась бычья панкреатическая ДНКаза I (Fermentas) и рекомбинантная человеческая ДНКаза I (Дорназа; Genetech). Раствор ДНКазы для введения готовился растворением матричного раствора ДНКазы в стерильном фосфатном буфере непосредственно перед введением. Циклофосфамид и Доксорубицин разводились в соответствии с указанием инструкции.

В проведенных сериях опытов *in vitro* мы не наблюдали подавляющего эффекта ДНКазы I на рост культур опухолевых клеток (при концентрации ДНКазы I до 100 мкг/мл), ДНК плазмы крови мышей-опухоносителей получали в соответствии с методикой описанной ранее.

Использовали высокометастатический и низкометастатический штаммы мышинной карциномы легких Люиса и карциномы Эрлиха. Клетки росли в среде RPMI-1640 с добавлением 10% эмбриональной телячьей сыворотки, 1% пеницилин-стрептомицина в среде с 5% углекислого газа. Для индукции опухолей у мышей клетки выращивали до монослоя, отделяли с помощью раствора трипсин-ЭДТА. Клетки трижды отмывали центрифугированием в фосфатном буфере и ресуспендировали до  $0,5 \times 10^7$  в 1 мл. Жизнеспособность определяли по включению метиленового синего в гемоцитометре. Для введения животным использовали суспензии, содержащие не менее 95% жизнеспособных клеток. Использовали мышей линии C57Bl<sub>1</sub> и белые беспородные, полученные из питомника «Рапполово». Вес животных составлял 24-26 грамм. Животные содержались по 6-7 штук в клетке на стандартной диете без ограничения воды. Клетки LLC в дозе  $5 \times 10^5$  в 100 мкл. фосфатного буфера вводили в мягкие ткани бедра. Опухоль Эрлиха перевивали под кожу правого бока введением 0,2 мл 10% -ной взвеси клеток в изотоническом растворе хлорида натрия

В некоторых экспериментах исследовали содержание ДНК в плазме крови мышей. ДНК выделяли по ранее описанному протоколу. Содержание ДНК измеряли спектрофотометрически.

Изобретение иллюстрируется следующими примерами:

5 Пример 1.

Влияние ДНК азы I при ежедневном двукратном введении на рост опухоли Эрлиха у мышей.

Группа 1 – 10 мышей с привитой карциномой Эрлиха (контроль).

10 Группа 2- 10 мышей с привитой карциномой Эрлиха, получавших ДНКазу два раза в день ежедневно с 3 по 7 день после перевивки опухоли в дозе 1 мг/кг внутривенно в 200 мкл фосфатного буфера.

Группа 3 – 10 мышей с привитой карциномой Эрлиха, получавших ДНКазу два раза в день ежедневно с 3 по 7 день после перевивки опухоли в дозе 2 мг/кг внутривенно в 200 мкл фосфатного буфера.

15 Результаты экспериментов оценивали по торможению роста опухоли (ТРО), выраженному в процентах к данным контроля, полученных в последний день введения ДНКазы с использованием стандартной формулы.

Размер опухоли через 7 дней после перевивки

Группа	Объем опухоли	Т%	Р
1	86+/-12	-	-
2	33+/-6	61%	p<0,001
3	34+/-7	60%	p<0,001

20 Полученные данные указывают, что введение ДНК азы вызывает выраженное торможение развития опухоли у мышей.

Пример 2

Использование различных схем введения ДНКазы для торможения развития опухоли Эрлиха.

В наших экспериментах терапевтической мишенью ДНКазы является ДНК, циркулирующая в плазме крови больных. Для обеспечения наибольшего терапевтического эффекта необходимо длительное присутствие ДНКазы в плазме крови в каталитически эффективных

- 5 количествах. В связи с этим многократное введение ДНКазы должно давать лучший эффект по сравнению с двукратным ее введением в той же суточной дозе.

Группа 1 – 10 мышей с привитой карциномой Эрлиха (контроль).

- 10 Группа 2- 10 мышей с привитой карциномой Эрлиха, получавших ДНКазу два раза в день ежедневно с 3 по 7 день после перевивки опухоли в дозе 1 мг/кг внутривбрюшинно в 200 мкл фосфатного буфера.

- 15 Группа 3 – 10 мышей с привитой карциномой Эрлиха, получавших ДНКазу четыре раза в день ежедневно с 3 по 7 день после перевивки опухоли в дозе 0,5 мг/кг внутривбрюшинно в 200 мкл фосфатного буфера. Результаты экспериментов оценивали по торможению роста опухоли (ТРО), выраженному в процентах к данным контроля, полученных в последний день введения ДНКазы с использованием стандартной формулы.

Размер опухоли через 7 дней после перевивки

Группа	Объем опухоли	Т%	P
1	98+/-14	-	-
2	23+/-6	76	P<0,001
3	32+/-6	67%	P<0,001

- 20 Полученные данные указывают, что дробное (четырёхкратное) введение ДНКазы при той же суммарной суточной дозе действительно вызывает более значительное угнетение роста опухоли, чем двукратное введение. Содержание ДНК в плазме крови мышей 2 группы по окончании курса лечения составило 38,3 нг/мл, в то время как у мышей контрольной
- 25 группы 104,8 нг/мл; у мышей 3 группы – 55,1 нг/мл. У здоровых мышей

содержание ДНК в плазме составило 12,0 нг/мл. ( $p < 0,01$ ). Таким образом, многократное введение ДНКазы в течение суток приводит к более выраженному снижению содержания ДНК в плазме больных животных и более выраженному подавлению роста опухоли, по сравнению с 2х

5 кратным введением той же суточной дозы.

### Пример 3

Совместное использование ДНК азы и противоопухолевого препарата доксорубина. Группа 1 – 10 мышей с привитой карциномой Эрлиха (контроль). Группа 2- 10 мышей с привитой карциномой Эрлиха, получавших Доксорубин один раз в день ежедневно с 3 по 7 день после перевивки опухоли в дозе 2мг/кг внутривенно. Группа 3 – 10 мышей с привитой карциномой Эрлиха, получавших ДНКазу четыре раза в день ежедневно с 3 по 7 день после перевивки опухоли в дозе 0,5 мг/кг внутривенно в 200 мкл фосфатного буфера и Доксорубин один раз в день ежедневно с 3 по 7 день после перевивки опухоли в дозе 2мг/кг внутривенно. Группа 4-10 мышей с привитой карциномой Эрлиха, получавших ДНКазу четыре раза в день ежедневно с 3 по 7 день после перевивки опухоли в дозе 0,5 мг/кг внутривенно в 200 мкл фосфатного буфера. Результаты экспериментов оценивали по торможению роста опухоли (ТРО), выраженному в процентах к данным контроля, полученных в последний день введения ДНКазы с использованием стандартной формулы.

Размер опухоли на 7 день после перевивки

Группа	Объем опухоли	Т%	Р
1	98+/-14	-	-
2	57+/-10	42	$P < 0,05$
3	20+/-6	78	$P < 0,01$
4	0	100%	

Полученные данные указывают, что доксорубицин самостоятельно угнетает рост опухоли слабее чем ДНКазы. При совместном применении проявляется выраженный синергизм между ДНКазой и доксорубицином, выражающийся в полном подавлении роста опухолей (опухоли не определялись не у одного из экспериментальных животных).

#### Пример 4.

Влияние ДНК азы на формирование бактериальной биопленки.

Для выявления возможных механизмов действия ДНК-азы на взаимодействие бактерий с организмом хозяина мы оценили её влияние на формирование биопленок.

Эксперименты проводили на модели биопленок, получаемых на поверхности стекла при лабораторном культивировании. Были использованы неродственные грамположительные (*Staphylococcus aureus* VT-209) и грамотрицательные (*Escherichia coli* ATCC25922) бактерии. Бактерии засекали в синтетическую среду М9 с добавками, необходимыми для использованных штаммов бактерий, в количестве  $10^9$  бактерий/мл и инкубировали при  $37^{\circ}\text{C}$  на протяжении 72 часов. ДНК-азу добавляли в количество 100 мкг/мл сразу после внесения бактерий. В контроле добавляли идентичный объем фосфатного буфера. Отдельные флаконы отбирали для анализа каждые 24 часа.

Стекла промывали PBS буфером, фиксировали, окрашивали метиленовым синим и изучали с помощью световой микроскопии.

В результате установлено, что в присутствии ДНКазы не происходило образование нормальной биопленки. Наблюдалось только прилипание к стеклу отдельных микроорганизмов, которое не приводило к образованию микроколоний и биопленок.

Контрольные высевы из флаконов для определения числа в них жизнеспособных бактерий, способных образовывать колонии на плотной

среде (КОЕ), показало, что в присутствии ДНКазы не происходит гибели клеток, приводящей к снижению числа КОЕ по сравнению с контролем. Таким образом, полученные данные указывают, что ДНКазы не вызывает гибели стафилококков и эшерихий, но мешает их кооперативному поведению, приводящему к формированию биопленок.

Пример 5.

Использование ДНК азы для лечения экспериментального сепсиса.

Исследование проводили на беспородных белых мышах 24-26 гр:

Животным в ретроорбитальный синус вводили патогенный штамм

10 *Staphylococcus aureus* VT-2003R в количестве  $1 \times 10^{10}$  бакт/животное.

ДНК азу вводили внутривентриально. В контрольной группе по аналогичной схеме вводили изотонический раствор хлорида натрия или пенициллин. Каждая группа включала 10 животных. Введение

15 препарата продолжалось 1-3 дня со дня заражения 4 раза в день по 500

мкг/кг внутривентриально. Пенициллин вводили внутримышечно.

Эффективность действия оценивали по числу животных, выживших после гибели последнего погибшего в контрольной группе. В контрольной группе к 3 дню погибли все зараженные животные. Среди

животных, получавших ДНК-азу к 3 дню остались живы 6 животных.

20 Защита составила - 67%. Полученные данные указывают на возможность и эффективность использования ДНК азы для лечения инфекционных состояний.

Пример 6.

Уровень свободно циркулирующей в плазме ДНК у онкологических 25 больных и у здоровых доноров.

ДНК плазмы крови онкологических больных и ДНК плазмы крови здоровых доноров отличаются - не только своим генетическим репертуаром, но и количеством ДНК, содержащейся в плазме крови. В таблице ниже приведены данные по содержанию ДНК в плазме крови у

10 больных различными формами опухолей и 10 здоровых добровольцев.

Выделение ДНК из плазмы и определение концентрации ДНК проводили по протоколу, описанному ранее.

Пациент	Пол, возраст	Опухоль, стадия	Содержание ДНК; нг\мл
1	М, 67	Карцинома легкого T2N2M0	123
2	Ж, 37	РМЖ T2N0M0	78
3	Ж, 53	Карцинома желудка T3N2M1	90
4	М, 54	РТК T2N2M2	340
5	М, 64	РТК T2N1M0	182
6	М, 56	Карцинома легкого T3N2M1	99
7	Ж, 49	РТК T2N1M0	75
8	М, 65	Карцинома желудка T3N1M0	120
9	М, 36	Остеогенная саркома T3N1M2	243
10	Ж, 50	РМЖ T3N1M0	165
11	М, 24	Доброволец	10
12	М, 32	Доброволец	27
13	Ж, 21	Доброволец	45
14	Ж, 19	Доброволец	7
15	Ж, 21	Доброволец	13
16	Ж, 23	Доброволец	89
17	М, 28	Доброволец	11
18	Ж, 32	Доброволец	15
19	Ж, 25	Доброволец	17
20	М, 38	Доброволец	5

5. Из таблицы видно, что содержание ДНК в плазме крови здоровых добровольцев значительно ниже, чем в плазме больных различными формами злокачественных новообразований.

## Пример 7

Последовательности ДНК клонов, полученных из ДНК свободно циркулирующей в плазме больного злокачественной мезотелиомой.

Клон 1

5 Дупликон, хромосома 15 и Y

Последовательность №1.

Клон 3

Уникальный, хромосома 2

Последовательность №2

10 Клон 8

MLT2B повтор

Последовательность №3

Клон 9

Центромерная сателлитная ДНК

15 Последовательность №4

Клон 10

MLT2B повтор

Последовательность №5

Клон 20

20 L1MC4-like (LINE-элемент)

Последовательность №6

Клон 15

Алфа-сателлитная ДНК

Последовательность №7

25 Клоны 18, 21

Алфа-сателлитная ДНК

Последовательность №8

Клон 24

Уникальный, семейство G protein-связанных белков, хромосома 6

Последовательность №9

Клон 25

Уникальный, хромосома 3

Последовательность №10

5 Клон 26

SatB1/Vimentin/nuclear matrix связывающая ДНК

Последовательность №11

Клон 33

Дупликон, хромосома 10

10 Последовательность №12

Клон 32

Альфа-сателлитная ДНК

Клон 35

LTR повтор

15 Последовательность №13

Клон 36

Уникальный, хромосома 18

Последовательность №14

Клон 37

20 Уникальный, хромосома 4

Последовательность №15

Клон 41

Последовательность №16

Клон 43

25 Snf2-related CBP activator protein (SCRAP) Уникальный, хромосома 16.

Последовательность №17

Клон 45

Уникальный, хромосома 3

Последовательность №18

Клон 47

Альфа-сателлитная ДНК

Клон 51

Уникальный, SRY-бокс содержащий ген

5 Последовательность №19

Клон 52

Повтор

Последовательность №20

Клон 53, 55

10 Альфа-сателлитная ДНК

Последовательность №21

КЛОН 56

ЦЕНТРОМЕРНЫЙ ПОВТОР

Последовательность №22

15 Клон 60

Повторяющийся на нескольких хромосомах ген, содержит MER5A  
повтор.

Последовательность №23

Клон 62

20 Повтор

Последовательность №24

Клон 65

Уникальный, хромосома 3

Последовательность №25

25 Клон 71

Уникальный, хромосома 2

Последовательность №26

Клон 72

Уникальный, хромосома 8

Последовательность №27

Клон 73

Уникальный

Последовательность №28

5 Клон 78

Transposon Tigger фрагмент

Последовательность №29

Клон 81

Последовательность №30

10 Повтор (LINE)

Клон 82

Уникальный , хромосома 1

Последовательность №31

Клон 83

15 Уникальный ,Fibroblast activation protein alpha; cell surface serine protease,  
хромосома 2

Последовательность №32

Клон 79

Альфа-сателлитная ДНК

20 Клон 86

Уникальный, высокая гомология с brain testican , хромосома 4

Последовательность №33

Клон 90

Уникальный, хромосома X

25 Последовательность №34

Клон 93

Уникальный, хромосома 9

Последовательность №35

Клоны 89 и 92

Альфа-саттелитная ДНК

Клон 96

Фрагмент LINE.

Последовательность №36

5 Клон 97

Уникальный, хромосома 2, Lipin

Клон 98

Уникальный, хромосома X

Последовательность №38

10 Клон 102

Уникальный, хромосома 17

Последовательность №39

Клон 99

Альфа-саттелитная ДНК

15 Клон 105

Уникальный, хромосома 13

Последовательность №40

Клон 106

Уникальный, хромосома 9

20 Последовательность №41

Клон 107

Уникальный, хромосома 8

Последовательность №42

Клон 111

25 Уникальный, хромосома 12

Последовательность №43

Клон 112

Уникальный, хромосома 5

Последовательность №44

- Клон 114  
Уникальный, хромосома 8, Interleukin 7  
Последовательность №45
- Клон 116
- 5 Уникальный, хромосома 1  
Последовательность №46  
Клон 121  
Уникальный, хромосома 5, Dynein  
Последовательность №47
- 10 Клон 115; 119; 120  
Альфа-сателлитная ДНК  
Клон 125  
Уникальный, хромосома 9  
Последовательность №48
- 15 Клон 127  
Уникальный, хромосома 20  
Последовательность №49  
Клон 130  
Уникальный, хромосома не определена.
- 20 Последовательность №50  
Клон 124  
SatB1/Vimentin/nuclear matrix связывающая ДНК  
Клон 133  
Альфа-сателлитная ДНК
- 25 Клон 137  
MLT1A2 повтор  
Последовательность №51  
Клон 140  
Уникальный, хромосома 2, zinc finger protein, subfamily 1A

- Последовательность №52  
Клон 141  
Уникальный, хромосома 2  
Последовательность №53
- 5 Клон 143  
Фрагмент Alu-повтора  
Последовательность №54  
Клон 144  
Уникальный, хромосома 2
- 10 Последовательность №55  
Клон 146  
Уникальный, хромосома 4  
Последовательность №56  
Клон 139 и 142
- 15 Альфа-сателлитная ДНК  
Клон 148  
Повтор (хромосомы 1,2 и 4)  
Последовательность №57  
Клон 152
- 20 Уникальный, хромосома 16, KRAB-Domain, zinc finger protein  
Последовательность №58  
Клон 154  
Уникальный хромосома 9  
Последовательность №59
- 25 Клон 161  
Фрагмент LINE  
Последовательность №60  
Клон 151  
Уникальный, хромосома 5

Последовательность №61

Клон 150

Уникальный, хромосома 1

Последовательность №62

5 Клон 153

Уникальный, хромосома 11

Последовательность №63

Клон 159

Уникальный, хромосома 6

10 Последовательность №64

Клон 163

Альфа-сателлитная ДНК

Последовательность №65

Клон 166

15 Уникальный, хромосома 12

Последовательность №66

Клон 167

Уникальный, хромосома 18 , cadherin 2, type 1, N-cadherin

Последовательность №67

20 Клоны 169, 170

Уникальный, хромосома 18

Последовательность №68

Клон 178

Уникальный, хромосома 1, RAMP: RA-regulated nuclear matrix-associated

25 protein

Последовательность №69

Клон 180

Уникальный, хромосома 20

Последовательность №70

- Клон 181  
Уникальный, хромосома 18  
Последовательность №71  
Клон 185
- 5 Альфа-сателлитная ДНК  
Последовательность №72  
Клон 187  
Мег повтор  
Последовательность №73
- 10 Клон 188  
HSATII повтор  
Последовательность №74  
Клон 189  
Уникальный, хромосома 9
- 15 Последовательность №75  
Клон 190  
Уникальный, хромосома 1, melanoma antigen recognized by T cells 2  
Последовательность №76  
Клон 195
- 20 Уникальный, хромосома 10  
Последовательность №77  
Клон 196  
Уникальный, хромосома X  
Последовательность №78
- 25 Клон 197  
Уникальный, хромосома 1, FAF1: Fas (TNFRSF6) associated factor 1  
Последовательность №79  
Клон 200  
Уникальный, хромосома 8

Последовательность №80

Клон 202

Уникальный, хромосома 13

Последовательность №81

5 Клон 205

Альфа-саттелитная ДНК

Последовательность №82

Клон 206

Повтор

10 Последовательность №83

Клон 208

Уникальный, хромосома 8, Human DEAD box RNA helicase-like protein

Последовательность №84

Пример 8. Последовательности ДНК клонов, полученных из свободно

15 циркулирующей в плазме здорового донора ДНК.

Клон 1

Уникальный, хромосома 5

Последовательность №85

Клон 9

20 Уникальный, хромосома 21

Последовательность №86

Клон 7

Уникальный, хромосома 3

Последовательность №87

25 Клон 8

Уникальный, хромосома 4

Последовательность №88

Клон 10

18S RNA ген

Последовательность №89

Клон 11

Повтор Alu

5 Последовательность №90

Клон 13

Уникальный, хромосома 3

Последовательность №91

Клон 15

10 Уникальный, хромосома 1

Последовательность №92

Клон 16

Уникальный, хромосома 3, neutral endopeptidase

Последовательность №93

15 Клон 17

Уникальный, хромосома 8

Последовательность №94

Клон 18

Уникальный, хромосома 1

20 Последовательность №95

Клон 21

Уникальный, хромосома 19, Zinc Finger protein

Последовательность №96

Клон 22

25 Уникальный, хромосома 18

Последовательность №97

Клон 23

Уникальный, хромосома 7, muskelin 1

Последовательность №98

Клон 25

Уникальный, хромосома 11

Последовательность №99

Клон 27

5 Повтор

Последовательность №100

Клон 29

Уникальный, хромосома 6

Последовательность №101

10 Клон 30

Уникальный, хромосома 14

Последовательность №102

Клон 31

Уникальный, хромосома 17

15 Последовательность №103

Клон 32

MER4B повтор

Последовательность №104

Клон 33

20 Уникальный, хромосома 1

Последовательность №105

Клон 34

Уникальный, хромосома 2

Последовательность №106

25 Клон 35

Повтор

Последовательность №107

Клон 36

Уникальный, хромосома 1

Последовательность №108

Клон 37

HERVH повтор

Последовательность №109

5 Клон 41

Уникальный, хромосома X

Последовательность №110

Клон 42

Уникальный, хромосома 6

10 Последовательность №111

Клон 43

Уникальный, хромосома 22, KREMEN1

Последовательность №112

Клон 44

15 Уникальный, хромосома 14

Последовательность №113

Клон 45

Уникальный

Последовательность №114

20 Клон 46

Уникальный, хромосома 20

Последовательность №115

Клон 47

Nf-карраВ

25 Последовательность №116

Клон 38

Уникальный, хромосома 16

Последовательность №117

Клон 48

Уникальный, хромосома 6

Последовательность №118

Клон 53

Уникальный

5 Последовательность №119

Клон 51

Уникальный, хромосома 5

Последовательность №120

Клон 59

10 Уникальный, хромосома 4, NFKB1: nuclear factor of kappa light  
polyrptide gene enhancer

Последовательность №121

Клон 61

Повтор

15 Последовательность №122

Клон 62

L1 повтор

Последовательность №123

Клон 64

20 Дупликон, хромосома 7

Последовательность №124

Клон 65

Рибосомальная ДНК

Последовательность №125

25 Клон 66

Рибосомальная ДНК

Последовательность №126

Клон 75

Повтор

- Последовательность №127  
Клон 76  
Уникальный, хромосома 4  
Последовательность №128
- 5 Клон 83  
Уникальный, хромосома 4  
Последовательность №129  
Клон 85  
Уникальный, хромосома 2, phospholipase C, epsilon
- 10 Последовательность №130  
Клон 87  
L1PA3 повтор  
Последовательность №131  
Клон 86
- 15 Уникальный, хромосома 5, CRTL1: cartilage linking protein 1  
Последовательность №132  
Клон 89  
Alu повтор  
Последовательность №133
- 20 Клон 92  
Уникальный, хромосома 6  
Последовательность №134  
Клон 100  
Уникальный, хромосома 6
- 25 Последовательность №135  
Клон 105  
AluSx повтор  
Последовательность №136  
Клон 111

Alphoid repetitive ДНК

Последовательность №137

Клон 112

Уникальный, хромосома 9

5 Последовательность №138

Клон 113

Уникальный, хромосома 22

Последовательность №139

Клон 114

10 AluSx повтор

Последовательность №140

Клон 116

Уникальный, хромосома 9, 17kD fetal brain protein

Последовательность №141

15 Клон 123

Уникальный, хромосома 5

Последовательность №142

Клон 124

Уникальный хромосома 13

20 Последовательность №143

Клон 126

Уникальный, хромосома 8

Последовательность №144

Клон 130

25 Уникальный, хромосома 1

Последовательность №145

Клон 131

Уникальный, хромосома 4

Последовательность №146

Клон 136

Уникальный, хромосома 8

Последовательность №147

Клон 141

5 Уникальный, хромосома 2

Последовательность №148

Клон 146

Уникальный, хромосома 16

Последовательность №149

10 Клон 147

Уникальный, хромосома 5, nicotinamide nucleotide transhydrogenase

Последовательность №150

Клон 149

Уникальный, хромосома 9

15 Последовательность №151

Клон 151

Уникальный, хромосома 16

Последовательность №152

Клон 152

20 Уникальный, хромосома 6, BAI3: brain-specific angiogenesis inhibitor 3

Последовательность №153

Клон 153

Уникальный, хромосома 10, GAD2: glutamate decarboxylase 2

Последовательность №154

25 Клон 155

Уникальный, хромосома 9

Последовательность №155

Пример 9

Чувствительность ДНК, циркулирующей в плазме, к действию ДНКаз.

ДНК из сыворотки свежей крови доноров (смесь от 5 доноров) выделяли стандартным фенол-хлороформным методом.

Осадок нуклеиновых кислот промывали 70% этанолом и растворяли в трис-ЭДТА буфере. Количество ДНК определяли по данным

5 спектрофотометрии при длине волны 260 нм (СФ-46). Полученную ДНК изучали электрофорезом в 0,8% полиакриламидном геле с окраской бромистым этидием. Часть полученной ДНК обрабатывали ДНКазой 1 в течение 3 часов при 37°C. В результате разделения в геле обработанной и необработанной ДНК установлено:

10 Необработанная ДНК образует после электрофореза одну компактную полосу, что свидетельствует о сравнительно идентичных по размеру фрагментах ДНК, циркулирующих в крови.

После обработки ДНКазой полоса в геле исчезает полностью.

15 Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что в сыворотке циркулирует ДНК, чувствительная к действию ДНКаз, и что она может быть ими полностью разрушена.

#### Пример 10

20 Результаты эксперимента по влиянию поликлональной сыворотки, содержащей антитела против ДНК на продолжительность жизни мышей с карциномой Эрлиха.

ДНК, циркулирующая в плазме крови онкологических больных может быть уничтожена или инактивирована не только разрушающими ДНК ферментами (например, ДНКазой), но и другими способами.

25 Антитела против ДНК выделяли из крови больных системной красной волчанкой по методике Shuster A.M.(Shuster A.M. et.al., Science, v.256, 1992, pp.665-667). Подобные анти-ДНК антитела способны не только связывать, но и осуществлять гидролиз ДНК.

Группа 1 – 7 мышей с привитой карциномой Эрлиха (контроль).

Группа 2- 6 мышей с привитой карциномой Эрлиха, получивших на 3й день после перевивки опухоли внутривенную инъекцию фракции человеческих анти ДНК антител (IgG) по 200 мкг на одно животное.

- 5 Группа 3- 6 мышей с привитой карциномой Эрлиха, получивших на 3й день после перевивки опухоли внутривенную инъекцию фракции неспецифического человеческого иммуноглобулина (IgG) по 200 мкг на одно животное.

Эффект определяли по торможению роста опухоли на 7 день после перевивки (ТРО, выраженное в процентах)

- 10 Размер опухоли через 7 дней после перевивки

Группа	Объем опухоли	Т%	Р
1	85+/-12	-	-
2	45+/-6	52%	p<0,001
3	79+/-7	7%	p<0,001

- Результаты показывают, что однократное введение антител против ДНК обладает выраженным противоопухолевым эффектом. Введение фракции антител, не содержащих антител, направленных против ДНК, не вызывает противоопухолевого эффекта.
- 15

#### Пример 11

Эффект вакцинации мышей фракцией ДНК плазмы крови, полученной от животных с карциномой Эрлиха, на перевивку и рост карциномы Эрлиха у иммунизированных животных.

- 20 ДНК из плазмы мышей с карциномой Эрлиха выделяли по описанной выше методике на 5 й день после перевивки опухоли. В качестве адьюванта для иммунизации использовали положительно заряженные многослойные липосомы. Образец ДНК смешивался с липосомами (20 мкг ДНК в 1 мг липидов).

- 25 Группа 1 – 6 неиммунизированных мышей

Группа 2 – 6 мышей, иммунизированных трехкратно внутрикожно с интервалом в 1 неделю (1мкг ДНК из плазмы крови в 50мкл липосомальной суспензии, содержащей 50мкг липосом).

5 Группа 3- 6 мышей, иммунизированных трехкратно внутрикожно с интервалом в 1 неделю 50 мкл липосомальной суспензии, содержащей 50мкг липосом без ДНК.

Группа 4- 6 мышей, иммунизированных трехкратно внутрикожно с интервалом в 1 неделю (1мкг ДНК телячьего тимуса (Sigma) в 50мкл липосомальной суспензии, содержащей 50 мкг липосом).

10 Через неделю после последней иммунизации всем мышам, включая неиммунизированный контроль, была перевита опухоль Эрлиха.

Результаты эксперимента оценивали по выживаемости животных на 30 и 50 день после перевивки опухоли.

Группа	30 день (число живых \ павших животных в группе)	50 день (число живых \ павших животных в группе)
1	0-6	0-6
2	5-6	3-6
3	0-6	0-6
4	2-6	0-6

15 Таким образом, иммунизация мышей ДНК из плазмы крови приводит к выраженному увеличению продолжительности жизни животных, привитых опухолью Эрлиха.

#### Пример 12

Выделение ДНК из матрикса биопленок, образованных грамположительными и грамотрицательными бактериями.

20 В опытах использованы биопленки, *Escherichia coli* и *Staphylococcus aureus*. Биопленки смывали с агара фосфатным буфером, после чего клетки и матрикс разделяли центрифугированием. Для выделения ДНК

из матрикса использовали стандартный фенол-хлороформный метод. Количество ДНК определяли по данным спектрофотометрии при длине волны 260 нм (СФ-46). Полученную ДНК изучали электрофорезом в 0,8% полиакриламидном геле с окраской бромистым этидием. Часть 5 полученной ДНК обрабатывали ДНК азой 1 в течение 3 часов при 37°C. В результате разделения в геле обработанной и необработанной ДНК установлено:

Необработанная ДНК образует после электрофореза одну компактную полосу, что свидетельствует о сравнительно идентичных по размеру 10 фрагментах ДНК, присутствующих в матриксе.

После обработки ДНК азой полоса в геле исчезает полностью.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что матрикс микробных сообществ грамположительных и грамотрицательных бактерий содержит внеклеточную ДНК, которая может быть разрушена 15 ДНКазой.

#### Пример 13

Динамика экспрессия Р-гликопротеина в опухоли Эрлиха у мышей, получающих терапию Доксорубицином, в процессе лечения и эффект ДНКазы I.

20 Лечение Доксорубицином вызывает в ткани опухоли экспрессию Р-гликопротеина, одного из основных медиаторов MDR (Multidrug Resistance) фенотипа. Ниже приведены результаты иммуногистохимического окрашивания гистологических срезов опухоли мышей получавших 5 дневный курс терапии Доксорубицином (2мг/кг 25 ежедневно внутривенно) и Доксорубицином + ДНКазы I (0,5 мг/кг; четыре раза в день на протяжении 5 дней). Лечение начинали на 3й день после перевивки опухоли. Препараты тканей изготавливались на 8 день после перевивки опухоли. После 5 дневного курса терапии в тканях опухоли наблюдается интенсивная многоочаговая экспрессия Р-

гликопротеина (Фиг.1). При комбинированном лечении Доксорубицин + ДНКазы как общий уровень экспрессии Р-гликопротеина так и количество Р-гликопротеин позитивных очагов в ткани опухоли значительно меньше (Фиг.1). Таким образом, лечение ДНКазой тормозит в опухоли развитие фенотипа множественной лекарственной устойчивости, вызываемое действием противоопухолевого антибиотика Доксорубицина.

#### Пример 14

Влияние ДНК плазмы мышей C57Bl с опухолью LLC, подвергшихся химиотерапевтическому лечению Доксорубицином на рост и метастазирование опухоли LLC у мышей C57Bl, получающих терапию Доксорубицином и эффект ДНКазы 1.

Опухоль LLC была перевита 30 мышам C57Bl. На 3 день после перевивки 20 мышей получили курс химиотерапии Доксорубицином в дозе 2 мг/кг внутривенно ежедневно в течении 5 дней, и 10 мышей получили терапию Циклофосфамидом в дозе 15 мг/кг однократно внутрибрюшинно на 3 день после перевивки. Подобный курс лечения не приводит к излечению животных, но приводит к замедлению роста опухоли на 8 день на 50% у животных, получивших химиотерапию Доксорубицином и к замедлению роста опухоли на 8 день на 30% у животных, получивших химиотерапию Циклофосфамидом.

На следующий день после окончания курса химиотерапии животных усыпляли, собирали суммарную плазму крови мышей 1 группы и мышей 2 группы. Суммарную фракцию ДНК плазмы крови после выделения хранили при  $-20^{\circ}\text{C}$  в фосфатном буфере.

В эксперименте участвовало 5 групп мышей, привитых LLC.

1 группа – 7 мышей контроль

2 группа – 6 мышей химиотерапия Доксорубицином по схеме 2 мг/кг внутривенно ежедневно в течении 5 дней с 3 по 8 день.

- 3 группа – 6 мышей химиотерапия Доксорубицином по схеме 2 мг/кг внутривенно ежедневно в течении 5 дней с 3 по 8 день + внутривенное двукратное (через день) введение суммарной фракции ДНК мышей, получивших химиотерапию Доксорубицином (0,05 мкг ДНК в 200 мкл фосфатного буфера в 1 й день лечения).
- 5 4 группа - 6 мышей химиотерапия Доксорубицином по схеме 2 мг/кг внутривенно ежедневно в течении 5 дней с 3 по 8 день + внутривенное двукратное (через день) введение суммарной фракции ДНК мышей, получивших химиотерапию Циклофосфамидом (0,05 мкг ДНК в 200 мкл фосфатного буфера в 1 й день лечения)
- 10 5 группа - 6 мышей химиотерапия Доксорубицином по схеме 2 мг/кг внутривенно ежедневно в течение 5 дней с 3 по 8 день + внутривенное двукратное (через день) введение суммарной фракции ДНК мышей, получивших химиотерапию Доксорубицином (0,05 мкг ДНК в 200 мкл фосфатного буфера в 1 й день лечения ) + внутрибрюшинное четырехкратное введение ДНКазы I в дозе 0,5мг/кг в 1й и 2й день лечения (по 4 внутрибрюшинных инъекции в сутки)

Размер опухоли на 8 день после перевивки

Группа	Объем опухоли
1	127+/-13
2	67+/-7
3	115+/-20
4	75+/-11
5	82+/-9

- Таким образом, ДНК плазмы крови мышей, получавших химиотерапию, специфическим образом способствует развитию лекарственной устойчивости опухолей к химиотерапевтическому лечению. Введение ДНКазы препятствует реализации этого эффекта.

Пример 15

Влияние ДНК плазмы мышей C57Bl с высокометастатическим штаммом опухоли LLC, на метастазирование низкометастатического штамма опухоли LLC у мышей C57Bl, и эффект ДНКазы I.

Опухоль LLC была перевита 30 мышам C57Bl. Мыши (20  
5 животных) получили прививку высокометастатического штамма и 10  
мышей получили прививку низкометастатического штамма. На 9 день  
после перевивки окончания курса химиотерапии животных усыпляли, и  
собирали суммарную плазму крови мышей 1 группы и мышей 2 группы:  
Суммарную фракцию ДНК плазмы крови хранили при  $-20^{\circ}\text{C}$  в  
10 фосфатном буфере.

В эксперименте участвовало 5 групп мышей, привитых опухолью LLC.

1 группа – 6 мышей с привитым низкометастатическим штаммом LLC.

2 группа – 6 мышей с привитым низкометастатическим штаммом LLC +  
15 внутривенное двукратное (через день) введение суммарной фракции  
ДНК мышей с привитым высокометастатическим штаммом (0,05 мкг  
ДНК в 200 мкл фосфатного буфера в на 7й и 8й день после перевивки).

3 группа – 6 мышей с привитым низкометастатическим штаммом LLC +  
внутривенное двукратное (через день) введение суммарной фракции  
20 ДНК мышей с привитым низкометастатическим штаммом (0,05 мкг ДНК  
в 200 мкл фосфатного буфера в на 7й и 8й день после перевивки )

4 группа - 6 мышей с привитым низкометастатическим штаммом LLC +  
внутривенное двукратное (через день) введение суммарной фракции  
ДНК мышей с привитым высокометастатическим штаммом (0,05 мкг  
25 ДНК в 200 мкл фосфатного буфера в на 7й и 8й день после перевивки )  
+ внутрибрюшинное четырехкратное введение ДНКазы I в дозе 1мг/кг  
на 7й и 8й день лечения ( по 2 внутрибрюшинных инъекции в сутки)

5 группа – 6 мышей с привитым высокометастатическим штаммом LLC.

Оценивалось количество метастатических узлов в легких на 15 день после перевивки (N).

Результаты эксперимента представлены в таблице

Группа	Нср.
1	12,0
2	24,1
3	14,6
4	11,6
5	33,6

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что ДНК из плазмы мышей с высокометастатическим штаммом LLC усиливает метастазирование низкометастатического штамма LLC. Введение больным животным ДНКазы I препятствует реализации этого эффекта.

#### Пример 16

10 Влияние ДНКазы I на продолжительность жизни мышей C57Bl с привитой опухолью LLC (высокометастатический штамм).

В эксперименте участвовало 5 групп мышей, привитых LLC.

1 группа – 7 мышей (контроль).

15 2 группа – 6 мышей, получавших внутрибрюшинно терапию ДНКазой в дозе 1 мг/кг 2 раза в сутки с 3 по 5 день после перевивки

3 группа – 6 мышей, получавших внутрибрюшинно терапию ДНКазой в дозе 1 мг/кг 2 раза в сутки с 3 по 10 день после перевивки.

4 группа – 6 мышей, получавших терапию ДНКазой в дозе 1 мг/кг 2 раза в сутки с 3 по 15 день после перевивки.

20 5 группа – 6 мышей, получавших терапию ДНКазой в дозе 1 мг/кг 2 раза в сутки с 3 по 18 день после перевивки.

Результаты эксперимента оценивали по выживаемости животных на 30 и 50 день после перевивки опухоли.

Группа	30 день (число живых \ павших животных в группе)	50 день (число живых \ павших животных в группе)
1	0-7	0-7
2	0-6	0-6
3	3-6	0-6
4	5-1	3-3
5	6-0	6-0

Хотя во 2ой и в 3ей группах наблюдалось выраженное торможение роста опухолей к последнему дню лечения ДНКазой, после отмены препарата  
5 рост опухоли возобновлялся и к 25 дню размер опухолей в этих группах сравнивался с контролем.

Наиболее длительный курс терапии ДНКазой (с 3 по 18 день; группа 6) привел к максимальному продлению жизни больных животных. Торможение роста опухоли к 18 дню составляло более 95%)

10 Во всех экспериментах однократное и многократное введение человеческой ДНКазы I в дозе до 2,5 мг/кг. (наибольшая доза, использованная в экспериментах) не оказывало токсического действия на животных.

Таким образом, ДНКазы I не оказывает прямого цитотоксического  
15 действия на опухолевые клетки (в наших экспериментах в концентрации 100 мкг/мл опытах *in vitro*), а полученные в примере данные подтверждают, что противоопухолевый эффект связан с разрушением ДНК в плазме крови, и лечебный эффект ДНКазы возрастает вместе с увеличением продолжительности курса лечения ДНКазой.

## Пример 17

Влияние различных способов разрушения, инактивации и связывания ДНК плазмы крови на способность ДНК плазмы крови мышей C57Bl с высокометастатическим штаммом опухоли LLC усиливать

- 5 метастазирование низкометастатического штамма опухоли LLC у мышей C57Bl.

Мыши (100 животных) получили прививку высокометастатического штамма опухоли LLC. На 9 день после перевивки и окончания курса химиотерапии животных усыпляли и собирали суммарную плазму крови

10 мышей. Суммарная фракция ДНК плазмы после выделения крови хранилась при  $-20^{\circ}\text{C}$  в фосфатном буфере.

В эксперименте участвовало 6 групп мышей, привитых низкометастатическим штаммом LLC.

- 1 группа — 6 мышей с привитым низкометастатическим штаммом LLC
- 15 2 группа — 6 мышей с привитым низкометастатическим штаммом LLC + внутривенное двукратное (на 7й и 8й день после перевивки) введение суммарной фракции ДНК мышей с привитым высокометастатическим штаммом (0,05 мкг ДНК перед введением растворялись в 500 мкл свежей гепаринизированной крови).
- 20 3 группа — 6 мышей с привитым низкометастатическим штаммом LLC + внутривенное двукратное (на 7й и 8й день после перевивки) введение суммарной фракции ДНК мышей с привитым высокометастатическим штаммом (0,05 мкг ДНК перед введением растворяли в 500 мкл. свежей плазмы). Перед введением образец подвергали фотохимической
- 25 дезинфекции (добавление 1 мкМ метиленового синего с последующим облучением красным светом в течении 10 минут (~60 000 Люкс).
- 4 группа — 6 мышей с привитым низкометастатическим штаммом LLC + внутривенное двукратное (на 7й и 8й день после перевивки) введение суммарной фракции ДНК мышей с привитым высокометастатическим

- штаммом (0,05 мкг ДНК перед введением растворяли в 500 мкл свежей плазмы). Перед введением образец дважды пропускали через колонку, содержащую DEAE-целлюлозу. 5 группа – 6 мышей с привитым низкометастатическим штаммом LLC + внутривенное двукратное (на 7й и 8й день после перевивки) введение суммарной фракции ДНК мышей с привитым высокометастатическим штаммом (0,05 мкг ДНК перед введением растворяли в 500 мкл свежей гепаринизированной крови). Перед введением в образец добавляли 1 мкг фрагмента А растительного токсина Рицина и инкубировали 1 час при 37°C. Рицин является представителем семейства RIP (белки инактивирующие рибосомы) токсинов, широко используемых для создания иммунотоксинов. Кроме способности инактивировать рибосомы эти белки обладают способностью деаденилировать ДНК. Для реализации токсического эффекта каталитическая единица А токсинов RIP II типа должна быть доставлена в клетку субъединицей В. В отсутствие субъединицы В цепь А не токсична, однако полинуклеотид-аденингликозидазная активность цепи А может быть использована для инактивации ДНК, циркулирующей в плазме.
- 6 группа – 6 мышей с привитым низкометастатическим штаммом LLC + внутривенное двукратное (на 7й и 8й день после перевивки) введение суммарной фракции ДНК мышей с привитым высокометастатическим штаммом (0,05 мкг ДНК перед введением растворяли в 500 мкл свежей гепаринизированной крови. ДНК. Суммарная фракция ДНК перед введением подвергалась ферментативному метилированию (I.Muiznieks et.al., FEBS Letters, 1994, v.344, pp.251-254).

Оценивали количество метастатических узлов в легких на 15 день после перевивки.

Результаты эксперимента приведены в таблице.

Группа	Нср.
1	12,0
2	22,5
3	14,1
4	15,5
5	15,1
6	12,3

Результаты свидетельствуют, что все примененные методы подавляли способность ДНК плазмы крови мышей с высокометастатическим штаммом опухоли LLC вызывать усиление метастазирования низкометастатического штамма опухоли LLC.

5 Пример 18. Влияние терапии ДНКазой I на развитие соматического мозаицизма.

В качестве модели соматического мозаицизма была изучена частота мутаций гена HPRT в Т-лимфоцитах крови. Человеческий HPRT ген (Хромосома Xq26) кодирует конститутивно экспрессируемый, но не эссенциальный фермент, вовлеченный метаболизм пуриновых оснований. Клонирование проводили по методике описанной Bigbee W (Bigbee W. Et al., Mutation Res., 1998, v.397, pp.119-136). Клонированию подвергались лимфоциты периферической крови 8 больных, получавших курс 3х недельной иммуностимулирующей терапии препаратом Неовир

10 после хирургического удаления опухоли. Из 8 больных 4 пациента дополнительно получали терапию человеческой рекомбинантной ДНКазой I ( 200 мкг/кг внутривенно, 4 раза в сутки в течении 3 недель). Частота встречаемости HPRT-дефицитных клонов в крови больных, получавших терапию ДНКазой I, в среднем была в 3 раза ниже таковой в

15 крови больных, получавших только иммуностимулирующую терапию.

20

Пример 19. Влияние терапии ДНКазой I на продолжительность жизни старых крыс.

В опыте использовали 24-месячных белых беспородных крыс. В опытной группе (10 животных) крысам, начиная с 24 месячного возраста, вводили

- 5 полисиалированную человеческую ДНКазу I в количестве эквивалентном 500мг/кг немодифицированного фермента внутривенно два раза в неделю на протяжении 2 месяцев. Крысам контрольной группы вводили плацебо. Продолжительность жизни крыс в контрольной группе составила в среднем 27, 8 месяца. Продолжительность жизни
- 10 крыс в опытной группе составила в среднем 30,1 месяц.

Пример 20 . Влияние терапии ДНКазой I на жизнеспособность бета-клеток поджелудочной железы и эндотелия аорты

- Бета-клетки эмбриональной поджелудочной железы человека и эндотелиальные клетки аорты человека использовали для
- 15 формирования первичной клеточной культуры. Через 24 часа после пассажа в одной экспериментальной серии в клеточные культуры добавляли ДНК, выделенную из плазмы больного тяжелой формой диабета 2 типа, осложненного системным атеросклерозом (0,0025 мкг на 1 мл культуральной среды) а в другой экспериментальной серии ДНК
- 20 больного перед введением в культуру подвергали ферментативному метилированию. Через 24 часа оценивали содержание жизнеспособных клеток по включению красителя трипанового синего.

Результаты эксперимента приведены в таблице:

- Процентное содержание жизнеспособных клеток через 48 часов после
- 25 пассирования .

Клетки	Контроль	ДНК больного	Метилированная ДНК
В-клетки	73%	43%	61%
Эндотелий	62%	35%	55%

### Промышленная применимость

Таким образом, настоящее изобретение свидетельствуют о том, что разрушение (связывание, инактивация) ДНК, циркулирующей в плазме крови, при онкологических и микроб индуцированных заболеваниях дает выраженный лечебный эффект.

В подтверждение найденного эффекта установлено, что ДНК плазмы крови больных содержит уникальные гены, принимающие участие в формировании и поддержании злокачественного фенотипа опухоли.

Связывание, разрушение или инактивация ДНК, циркулирующей в плазме крови дает леченый эффект при заболеваниях, связанных с накоплением и распространением в клетках организма соматических мутаций.

1. ДНК, циркулирующая в плазме крови, может быть уничтожена, инактивирована или удалена из плазмы крови, что может быть достигнуто использованием ДНКаз, сорбентов, антител или других методов, приводящих к инактивации разрушением, связыванием или модификацией циркулирующей ДНК.

Лечение, направленное на уничтожение ДНК плазмы крови, приводит к выраженному противоопухолевому эффекту при незначительной собственной токсичности.

Лечение, направленное на уничтожение ДНК плазмы крови, в сочетании с традиционными методами противоопухолевой терапии приводит к выраженному противоопухолевому эффекту.

Эффективность лечения, направленного на уничтожение ДНК плазмы крови, может определяться путем мониторингирования количества ДНК и генетических маркеров опухоли в плазме крови пациента, получающего такое лечение.

Клонирование и секвенирование ДНК плазмы крови онкологических больных может быть использовано для изучения генетических процессов, участвующих в онкогенезе и идентификации новых генов, связанных с процессами онкогенеза.

- 5 Клонирование и секвенирование ДНК плазмы крови здоровых людей может быть использовано для изучения процессов функционирования генома в норме и при развитии соматических заболеваний и идентификации новых генов, вовлеченных в эти процессы.
- 10 Фармацевтические композиции, содержащие компоненты инактивирующие разрушением, связыванием или модификацией ДНК плазмы крови, используются для лечения больных злокачественными опухолями, инфекциями, соматическими заболеваниями или для продления жизни. Для осуществления эффективной терапевтической экспозиции действующего компонента, необходимой для разрушения
- 15 ДНК плазмы и достижения терапевтического эффекта, используются фармацевтически приемлимые композиции и модификации, системы доставки лекарств, обеспечивающие максимальную системную циркуляцию действующего компонента в плазме крови и его контакт с
- 20 ДНК, циркулирующей в плазме. Основной путь введения — внутривенный. Однако могут быть использованы другие методы введения, обеспечивающие поступление действующего компонента в системную циркуляцию - подкожный, внутримышечный, ингаляционный, внутривентрикулярный и др. Дозы и режимы введения при этом определяются природой используемого активного ингредиента,
- 25 зависят от пути введения. Эффект контролируется по уровню содержания и динамике ДНК в плазме крови, наличием в нем опухолевых, инфекционных и других генетических маркеров, и наступлением положительной клинической динамики заболевания.

## ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ лечения онкологических и/или инфекционных и/или соматических заболеваний путем воздействия на биологические мишени  
5 внутри организма, отличающийся тем, что биологической мишенью является внеклеточная ДНК, в том числе, циркулирующая в плазме крови.
2. Способ лечения онкологических и/или инфекционных и/или соматических заболеваний по п.1, отличающийся тем, что внеклеточная  
10 ДНК инактивируется разрушением, связыванием или модификацией.
3. Способ лечения онкологических и/или инфекционных и/или соматических заболеваний по пп.1 или 2, отличающийся тем, что внеклеточная ДНК инактивируется разрушением, связыванием или модификацией путем введения в организм больного фармацевтического  
15 агента, способного разрушать, связывать или модифицировать свободно циркулирующую ДНК.
4. Способ лечения онкологических и/или инфекционных и/или соматических заболеваний по одному из пп.1-3, отличающийся тем, что внеклеточная ДНК инактивируется разрушением, связыванием или  
20 модификацией путем введения в организм больного фармацевтического агента, в количестве, достаточном для разрушения и терапевтическом режиме обеспечивающем разрушение, связывание или модификацию в течение периода времени, достаточного для достижения желаемого терапевтического эффекта.
- 25 5. Способ лечения онкологических и/или инфекционных и/или соматических заболеваний по одному из пп.1-4, отличающийся тем, что в организм больного вводят генетически модифицированные клетки или генотерапевтические конструкции, приводящих к синтезу в организме больного биополимеров, способных инактивировать путем связывания,

разрушения или модификации свободно циркулирующую в плазме крови больных ДНК.

5 6. Способ лечения онкологических и/или инфекционных и/или соматических заболеваний по пп.1 или 2, отличающийся тем, что внеклеточная ДНК, циркулирующую в плазме инактивируется путем разрушения связывания или модификации экстракорпоральными методами очистки крови.

10 7. Способ лечения онкологических и/или инфекционных и/или соматических заболеваний по пп.1,2 или 6, отличающийся тем, что экстракорпоральная очистка крови больного от свободно циркулирующей ДНК достигается иммунной или аффинной сорбцией.

15 8. Способ лечения онкологических и/или инфекционных и/или соматических заболеваний по пп.1,2 или 6, отличающийся тем, экстракорпоральная очистка крови больного от свободно циркулирующей ДНК достигается методами гравитационной хирургии крови.

20 9. Способ лечения онкологических и/или инфекционных и/или соматических заболеваний по пп.1,2 или 6, отличающийся тем, что экстракорпоральная очистка крови больного от свободно циркулирующей ДНК достигается биологической, химической или фотохимической инактивацией.

25 10. Способ лечения онкологических и/или инфекционных и/или соматических заболеваний по пп.1 или 2, отличающийся тем, что больного иммунизируют вакциной, содержащей в качестве антигена ДНК, свободно циркулирующую в плазме больного, в том числе, в комплексе со связанными с ней белками.

11. Способ лечения онкологических заболеваний по одному из пп.1-10, отличающийся тем, лечение сочетается с хирургическими,

химиотерапевтическими, гормональными, лучевыми  
иммунотерапевтическими методами.

12. Фармацевтический агент для лечения онкологических и/или  
инфекционных и/или соматических заболеваний, представляющий собой  
5 вещество, обладающее дезоксирибонуклеазной активностью и/или  
способное инактивировать внеклеточную ДНК, в том числе,  
циркулирующую в плазме крови больных.

13. Фармацевтический агент по п. 12, отличающийся тем, что вещество,  
обладающее дезоксирибонуклеазной активностью, представляет собой  
10 фермент дезоксирибонуклеазу.

14. Фармацевтический агент по п. 13, отличающийся тем, что  
дезоксирибонуклеаза модифицирована для достижения лучших  
фармакодинамических и фармакокинетических показателей и  
представляет собой аналог дезоксирибонуклеазы с повышенной  
15 активностью, аналог дезоксирибонуклеазы, нечувствительный к  
эндогенным ингибиторам дезоксирибонуклеазы, полисиалированную  
дезоксирибонуклеазу, пегилированную дезоксирибонуклеазу,  
дезоксирибонуклеаза связанную или смешанную с фармацевтически  
приемлемым носителем, в том числе, с синтетическими и природными  
20 микросферами, липосомами, декстраном, и другими корпускулярные  
природными и синтетическими полимерными носителями.

15. Фармацевтический агент по одному из пп. 12-14, отличающийся  
тем, что он дополнительно содержит рибонуклеазу и/или липазу и/или  
протеиназу.

25 16. Фармацевтический агент по п. 12, отличающийся тем, что вещество,  
обладающее дезоксирибонуклеазной активностью представляет собой  
антитела, обладающие нуклеазной активностью, в частности -  
поликлональные ДНК-абзимы, моноклональные ДНК - абзимы или их  
производные.


17. Фармацевтический агент по п. 12, отличающийся тем, что вещество, способное связывать ДНК, представляет собой антитела, способные связывать ДНК и его комплексы или их производные
18. Фармацевтическая композиция для лечения онкологических и  
5 инфекционных заболеваний, содержащая фармацевтический агент по одному из пп. 12-16 в терапевтически эффективном количестве и фармацевтически приемлемый носитель или наполнитель.
19. Способ увеличения продолжительности жизни, отличающийся тем, что достигается путем, инактивации внеклеточной ДНК циркулирующей  
10 в плазме за счет разрушения связывания или модификации по п. 2-17.
20. Способ профилактики возникновения и развития патологий, связанных с возникновением и развитием соматического мозаицизма за счет разрушения связывания или модификации ДНК по п. 2-17.
21. Метод контроля эффективности лечения онкологических и/или  
15 инфекционных и/или соматических заболеваний, а также оценки развития инфекции и контроля эффективности лечения, направленного на продление жизни путем измерения биохимических показателей больного, отличающийся тем, что для контроля подобного лечения используется мониторинг количества, размера молекул,  
20 соотношение фракций, связи с белками, липидами и сахарами, последовательности нуклеотидов ДНК, свободно циркулирующей в плазме крови.
22. Использование ДНК плазмы крови и внеклеточной микробной ДНК для выявления ДНК, вовлеченной в процесс возникновения и развития  
25 заболеваний, состоящее в её клонировании, секвенировании, идентификации генов, уникальных и повторяющихся последовательностей с их последующим изучением.

## РЕФЕРАТ


СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ, ИНФЕКЦИОННЫХ И  
5 СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ И  
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ

Изобретение относится к медицине и ветеринарии и раскрывает  
10 новый способ лечения онкологических, инфекционных и  
неинфекционных заболеваний, при котором главной мишенью  
терапевтического воздействия является свободно циркулирующая в  
плазме крови (и других жидких средах) ДНК, происходящая из  
находящихся в его организме опухолевых, мутантных, или  
15 инфицированных бактериями, грибами, простейшими клеток, а также из  
различных микроорганизмов. Описаны новые фармацевтические  
композиции и методы их применения для лечения онкологических  
заболеваний, инфекционных состояний, вызванных бактериями, грибами  
и простейшими, а так же неинфекционных соматических заболеваний и  
20 состояний, связанных с накоплением соматических мутаций клетках  
организма. Изобретение описывает лекарственные и иммунологические  
композиции, а также сорбционные и физико-химические технологии и  
способы их применения для лечения злокачественных опухолей и  
других заболеваний.

1/1



A



B

Фиг.1

## ПЕРЕЧЕНЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ

<110> Tets Viktor Veniaminovich, Genkin Dmitry Dmitrievich

<120> Способ лечения онкологических, инфекционных и соматических заболеваний, методы контроля эффективности лечения, фармацевтические агенты и композиция для осуществления лечения

<210> 1

<211> 485

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<400> 1

```
acgacggcca gtagcgcgcg gtaatacgac tcactatagg gcgaattggg taccggggccc 60
cccctcgagg tgcacgggat cgataagctt gatatcgaat tctgaccacc ccaaggtggc 120
catccttgtc cctgtgattc cagatctcca gaactggagg tctagcttca gggaaaaccc 180
agattttctt ggcttagccc acctgacagc taatcactgg aaatgggggtg ggctggtaga 240
gtccttttgt caggttttgt gtcaagagag ggaggaggaa agatggggagg gaggtagcaa 300
aactgggtctc aatggaaacta tgtaagttaa tatagaatgg caaagggatg tttcttccaa 360
ggaaagaatt cctgcagccc gggggatcca ctagtcttag agcggccgcc accgcggtgg 420
agctccagct tttgttcctt ttagtgaggg ttaattgcgc gcttggcgta atcatggtca 480
tagct
```

<210> 2

<211> 244

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<400> 2

```
gaattctcaa attattactg aggaaaatgt gacagtgcct caaagcagta gtaatttttt 60
ctcattatgc tgcatttatt attaaaacca acagtggaca gtgaatgact aactgatcct 120
tttttgggaa tattacttcc aatgaacgt taacttaaag attggaatat gaacacacta 180
ttgcttttac actagagagg ttactcctgg ccactctttc agcagcagtt agcttcagga 240
attc
```

<210> 3

<211> 230

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<400> 3

```
gaattcgcag taacttcctt gtgtgtgtgtg tattcaactc acagagttga acgatcgttt 60
acacagagca gacttgaaac actctttttg tggaaattca agtggagatt tcaattgttt 120
gaggtcaatg gtagaatagg aaatatcttg ctatagaaac tagacagaat gattctcaga 180
aactcctttg tgatgtgtgc cttcaactca cagagttaa ctttctttt
```

<210> 4

<211> 218

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<400> 4

```
gaattctcat gaaattgaaa tggatgggact catcatcgaa tggattcgaa tggaatcatc 60
gaataaaatt gattgag(a)at catcatcaaa tggaaatcgaa tggatcatt gaatggaatc 20
gaatggaatc atcatcagat ggaaatgaat ggaatcgtca tagaatccaa tcgaatggat 180
tcattgaatg gaatcagatg gaatcatcga gtgactga
```

<210> 5

<211> 182

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<400> 5

```
gaattctcta cagggacaga actaatggaa tatatgtatt atacagggga gtttattaaa 60
cattaactca catgatcaca aggtcccgcg ataggctgtc tgcaggcagg ggccaaggag 120
gccagtgaag ttccaaaact caagaaccta gagtcaatgt tcaagggc(?)a ggaagcatcc 180
```

2/24

ag

&lt;210&gt; 6

&lt;211&gt; 152

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 6

gaattcacag aaatcattgc cacaggcaag atctgatgaa ccttgatgaa tgctaaaatt 60  
 agttggtgaa agtttaagca gaaacagaat gtttgcataa aatgaagcaa aagaaggaaa 120  
 aaaaattatg agcccttgat ttaggggtct tt

&lt;210&gt; 7

&lt;211&gt; 131

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 7

gaattcttct gtctagagta acatgaagaa atcccgtttc caacgaaggc cctcaaggcg 60  
 gtcaattatc cacttcgaga ttctacagaa agagtgtttc aaaactgctc tatcaagaga 120  
 aatgttccac c

&lt;210&gt; 8

&lt;211&gt; 239

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 8

gaattccag taacttcctt gtgttggtga cattcaactc acagagttga acgttccctt 60  
 agacagagca gatttgaaac actctttttg tgcaattggc aagtggagat ttcaagecgt 120  
 ttaaggtcaa tggcagaaaa ggaaatatct tcgtttcaaa actagacaga atcattccca 180  
 caaactgcgt tgtgatgtgt tcgttcaact cacagagttt aacctttctt ttcataag

&lt;210&gt; 9

&lt;211&gt; 207

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 9

gaattctcta gacttccttg ggttttagcgc tgagtgaaga ggcacggaga gggtttggag 60  
 ctttagggta aagcactgat ggaagaaagg aattcctgca gcccggggga tccactagtt 120  
 ctagagcggc cgccaccgcg gtggagctcc agcttttgtt cccttttagtg agggttaaaa 180  
 gcgcgcttgc gtaatcatgg tcatagc

&lt;210&gt; 10

&lt;211&gt; 223

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 10

gaattcatcg ctaggactgt gttcttgttt attgggatgg gaagggagag aaaagatgag 60  
 aggggcaaaa gagaaaattt tggaaaatga gaaacttact ttattgcact gtctgtgcaa 120  
 ttgttggctt taaggaacaa atacactaaa ttcaaagatg ataaaaaaaa aaaacagctt 180  
 cacagagctg tagtaaacac cagatgttga aagagaagcg tat

&lt;210&gt; 11

&lt;211&gt; 198

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 11

gaattccatt tgatgacaat tccattcaat accaattgat gatgtttatt tttgattcca 60  
 tttgatgatg attacattcg attccatttc atcatgattc cattcgattc cactcgatga 120  
 ttccattcga ttccattcaa tgattattcc acttgagtcg attcgatgac tccattcgat 180  
 tgtattcgat ggtgattg

&lt;210&gt; 12

&lt;211&gt; 217

3/24

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 12

gaattctgcc aagcagtgc ttgattcatg aacactcact ggatgctgac tctgttgctc 60  
 ttctgagtgc tggggtagag gagaggatga ggtggacgca cagttcttgc ttttatgagc 120  
 ttatgttcta ggaaattcaa acaagtatgt tttcaggcag gtagtatgaa atagcaggaa 180  
 gaggaagcag gctaaaggga cacagagtga ttggggg

&lt;210&gt; 13

&lt;211&gt; 223

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 13

gaattcaggg ctgcagaaat ttgtgtaagt aaagaggagc agaatgttaa tagccaagac 60  
 aatgcaaaaa atgcattcaa ggtgttttga aaccttcatt gtagccctc ccattacaag 120  
 cctggaggnc tgggagggaa aaataatccc tgaaccagga caagggcctt atccctatgt 180  
 ctctgtacag tctcaggaca cagcactttg catcccagca gct

&lt;210&gt; 10

&lt;211&gt; 258

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 14

gaattcgctt acagtcagtt acaaatgctt tttagatctt caatgcttct gtgaagcctc 60  
 atatttgctg ttcagacaga cactataatg gagatggaat aaatggacag caactacaca 120  
 ggacggtgtg ggcagatggt gttggagcga ggggtgcagg tggagccac aggagaggaa 180  
 ggctgattga tcttctatgg ggagagcttc atagcacggg ggtggggcac acctgactgg 240  
 caagctgttt ggtgtgag

&lt;210&gt; 15

&lt;211&gt; 239

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 15

gaattctttt gaactagctg tgttttgaca gaggtttttt tttttttttt tctttttttg 60  
 gtttttttgc tctctgacaa aggccttttg aagaatgagc ttcttccccc acatctttat 120  
 ttattttattt atttttaagc tatgctcagg aaaatgaaca tttctccttt gcagttgata 180  
 acagcattta caaggtatag agcatatagg gttgttccaa attccttccc agataacca

&lt;210&gt; 16

&lt;211&gt; 226

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 16

gaattcctga atggtggg(6)6 tactgtgtgt ctctggccct attccctctc caggacaaac 60  
 ctcacccttt cctgcaaatg tactcaaaat agtacattta tccacgtcaa ttcagcaaag 120  
 gctgcagatc ctgggactac agtatctcag acgctgttct cagcgagctc atggtccagt 180  
 ggagagcaca gacaaacagc aaggcaggag aaatcgccct tgaagagccc agggag

&lt;210&gt; 17

&lt;211&gt; 156

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 17

gaattcagcc gtggcagtga gatggagtgt gtgttttagaa ctgttgattg atctggctct 60  
 ccctgattag gagggcgaga tcgagactcg gattgctgag ctgcggaagg agggtttctg 120  
 gtcactgaag aggctgccta aggtgccaga gcccc

&lt;210&gt; 18

&lt;211&gt; 191

&lt;212&gt; DNA

4/24

## &lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 18

gaattctaca aaagaaataa agcagagatg tgaaaggaat ttcttcaact atacacattt 60  
 tgacataatc atcttctaac atgggtgttta atttgctctg cttcacttag caatgatata 120  
 atgaatattt cccattttat tatatattct acaatatcac tttgaatgac tctcttaaga 180  
 gtgtattata c

&lt;210&gt; 19

&lt;211&gt; 312

&lt;212&gt; DNA

## &lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 19

cgacggccag tgagcgcgcg taatacgact cactataggg cgaattgggt accgggcccc 60  
 ccctcgaggt cgacggtatc gataagcttg atatcgcttg tgogctgaag gatgcaattc 120  
 tagacagagt tagctgggaa tgccctactg agaaggggcc atttgagtaa aggcctgaaa 180  
 aggtgaagaa gaattcctgc agcccggggg tccactagtt cttagagcggc cgccaccgcg 240  
 gtggagctcc agcttttggt cccttttagtg agggttaatt gcgcgcttgg cgtaatcatg 300  
 gtcatactgt tt

&lt;210&gt; 20

&lt;211&gt; 219

&lt;212&gt; DNA

## &lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 20

gaattccagt ggaatcagtt gtaatgtctc ctttttcata tctgatttta tttagtgtct 60  
 ttttttctta gatagtcttg ctaaagggtt ctcaatttat cttttcaaaa aatcttttca 120  
 ttttggtgat cttttttatt attttcttca tttcattttt atttatttct gctctgatct 180  
 ttattatttc ttttcttcta ataatttgg gtttagttt

&lt;210&gt; 21

&lt;211&gt; 208

&lt;212&gt; DNA

## &lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 21

gaattctcag taacttcctt gtgttggtg tattcaactc acagagttga acgatccttt 60  
 acacagagcg gacttgaaac actctttttg tggaatttgc aagtggagat ttcagccgcg 120  
 ttgaggtcaa tggtagaaaa ggaaatatct tcgtataaaa actagacaga atgattctca 180  
 gaaactcctt tgtgatgtgt gtgttcaa

&lt;210&gt; 22

&lt;211&gt; 262

&lt;212&gt; DNA

## &lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 22

gaattcaatg gaatggaatg gacaggaatg gaatggaatg gaaaggaatg gagtggaaatg 60  
 gactagaatg gaatggaatg gaatgaaatc aacccgattg gaatggaatg gaatgcaatg 120  
 gaatggaatg gaatcaactg gaaaggaatc aaatagaacg gaatggaata gaatggaatg 180  
 gattggaatg gaatggaatg gattcaaccg gagtggaaatg gaatggaata gaatggaata 240  
 aacaacgagt ggaatggaat gg

&lt;210&gt; 23

&lt;211&gt; 218

&lt;212&gt; DNA

## &lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 23

gaattcgttg aggagcttct ggaaagtgc cattctgact cagcaggtat tggagtctgc 60  
 atttctcatg agcactcagg tgatgaaaga gctggctcctt ggacacagct ctgaatagca 120  
 agggaatagc tttcctttag agaaatctgg aaaaagaacc actggagagc aatttaaaaa 180  
 ataacagaat ccagggaaag ctttaatttc cttttatt

&lt;210&gt; 24

5/24

&lt;211&gt; 213

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 24

gaattcaaag gaatcatcat caaatagaac cgaatggaat cctcattgaa tggaaatgaa 60  
 aggggtcatc atctaattgga atcgcatgga atcatcatca aatggaatcg aatggaatca 120  
 tcatcaaag gaatcgaatg gaatcatcat caaatggaat ctgatggaat cattgaacag 180  
 aattgaatgg aatcgatcat gaatgaattg aat

&lt;210&gt; 25

&lt;211&gt; 229

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 25

gaattctgtg cgtatcttag aagtagaatt ataagatttg tggatatgtt agttttggag 60  
 tgtgagggtca aaggcgcttt gagcaacttg taagaaacca tttttaaggc ggaagtcggg 120  
 aattttgttt tttatatgtt gaatttgaaa tccttattaa acatccaagt ggagaggctg 180  
 gatagacaat taaatttaga ccctgaggtt cgggaaggaa gtccaatgg

&lt;210&gt; 26

&lt;211&gt; 216

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 26

gaattcttca agaaacatca aggagggatg tatagatagt tttttaaaaa accgaaatgt 60  
 aaaagaaata caagaagaat ggaacatct acataacgag agtggaaaga aatgaaaata 120  
 gaggtagata gattagatag atagatagat agatagattg attgatggat tgatagattg 180  
 atagatatag aaataaaaga aagaaaatag aagatg

&lt;210&gt; 27

&lt;211&gt; 244

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 27

gaattccaat gcaatgttaa acagaaagca gccctttttt tcaaaattta taggcaagg 60  
 gttaacata tggctaaata atgttaattt atagtaaata tccttcataa ggaatgaag 120  
 gtacccttct attttagttt gctgagtgtc ttttagtcat aattgagtgt tgacatctgt 180  
 caaatatttt ttctgcatct attaagacat ccatgtgata tttctctttt attctcttac 240  
 tatg

&lt;210&gt; 28

&lt;211&gt; 237

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 28

gaattcaatc accatcgaat acaatcgaat ggagtcacg aatcgactca agtggaaata 60  
 tcattgaatg gaatcgaatg gaatcatcga gtggaatcga atggaatcat gatgaaatgg 120  
 aatcgaatgt aatcatcatc aaatggaatc aaaaataaac atcatcaatt ggtattgaat 180  
 ggaattgtca tcaaatggaa ttctctgcagc ccgggggagc cactagtctt agagcgg

&lt;210&gt; 29

&lt;211&gt; 184

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 29

gaattctttc cagaaggttt ttaatttact ttgctcggct ccatcagggg aatcactatg 60  
 gcagctatag ccttaagaaa tttatttctt aaataagact tgagagtcag aattgcttct 120  
 ttatccatgg tctcgaggat gggatgttgt gatagcaggc gtgaaaacaa cattcatctc 180  
 ctgg

&lt;210&gt; 30

6/24

&lt;211&gt; 191

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 30

gaattcagaa tctggatggc aaggaagcgc atcaagatgc aggagaaagt tgaaacctaa 60  
 tccaaggaat acagtaaaac aatccagaag cttgaaagac aaaatagcca ttttaagaac 120  
 caaactgagc ttctggaagg gaaaaattta cttcaagaat ttcataatac aatcaaaagt 180  
 attttttttt t

&lt;210&gt; 31

&lt;211&gt; 143

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 31

Gaattccgct tggggaggga actgtcttcg tccaggaaaa tgtttttnat aagccaccca 60  
 tggtaaaagg agaagtcagc acggttaggg tgttggcagg aatcaaatta agaaaaggaa 120  
 tggctatcca tccggttgta tgt

&lt;210&gt; 32

&lt;211&gt; 169

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 32

gaattctaga ctgctgcacc tccatatacct cagcaactgg catgatgatg agcagggagt 60  
 tagtagaact aatacactaa tatgtaaatg aatgaatgaa tgtttcctga gtgtggcttt 120  
 aagtttctca gaagaagaca gttcatacac tggcgcataa aattctggg

&lt;210&gt; 33

&lt;211&gt; 124

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 33

gaattctagg acaaggtgat tgtcctagat tttctcttaa acgcctcctg ttagatagga 60  
 aatggccatt aatagagaag cttgcttgag ggagtaaccc tgaaagccca ggccctggaca 120  
 cccg

&lt;210&gt; 34

&lt;211&gt; 214

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 34

gaattctaag tttatatagg ttacaacatc acagtaagaa tgtcacagag gggatatatgc 60  
 ttttcatcaa acaacaaatt gaaaattttt taactcttaa ggactgattt tgcttaacta 120  
 caagttatgc actgatggta gtagcttcac aaatttagaa aagttccaaa ataatgctta 180  
 gaaagagtag ctatttaact tctcattgaa caaa

&lt;210&gt; 35

&lt;211&gt; 164

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 35

gaattcctgt gaatgtcgtt tcaaataatta ctcagcctac gcaactgacca gaacttattt 60  
 tttacagaat cattttgaca ggaaaagtgt ttatgatagt tttgttggtg ttgttggtgt 120  
 tttgtttttt catcaccag gctgcttcac atttagagct gagt

&lt;210&gt; 36

&lt;211&gt; 119

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 36

7/24

gaattctgag aactagccct ttaagactgg tggagattta ttcaggaggg aagccctgcc 60  
ccagggaaaa gttgccaaga gacttgtnnt taggagatca ccagcccaa tttccatga

&lt;210&gt; 37

&lt;211&gt; 208

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 37

gaattccctt catatTTTTg gtcaaagccc agTTTTctg agtcgggtggg ctaaattggga 60  
ttactctttc taatgaggca tccttggtg cttagaatca ctcttgactt tatcctgtcc 120  
ccctcgggtt cctaacttac caggatggag agcatttcct cattccatgt tgttgggagg 180  
ttggccact gggtgacatc agcccagg

&lt;210&gt; 38

&lt;211&gt; 169

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 38

gaattcctta acccttaatt agctttgggt tttgctcaat atcctgaagc tgggcacagt 60  
ctcaatgtaa ctattctcct aggggctgaa ctgggtgcta gtcacaaag tttggaatgt 120  
cattttagaa gcaacctcta gaagtaatcc tggttaagccc tagaagtaa

&lt;210&gt; 39

&lt;211&gt; 172

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 39

gaattcccat ctttttttgt gtgtgtgttt gagactgtat tttgcattgt cgtccacact 60  
ggagtacagt ggcgtgatct ccgctcgtg caagctccgc ctcattggatt taagcgattc 120  
tcctgcctca gcctcccaag tggctgggac tacagggtgc cgaccaacca cg

&lt;210&gt; 40

&lt;211&gt; 137

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 40

gaattctggt acttggtgat gggaaaccgt gaaggtttta agcaagactg tgatgtgctt 60  
aggtttatta gaaggttcta tgctgctcag cctccctgtc tagttctttg ctttattgac 120  
tgtntcctca ctaaattg

&lt;210&gt; 41

&lt;211&gt; 152

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 41

gaattctttt ttccccagct ttatggagat ttaattgaca aataaaatgg catatatTTA 60  
gggttatata ttgatatat gtatacattg tgaaacgatt actataatga agttaattaa 120  
catattcctc atcttgcata gtcaccattt tt

&lt;210&gt; 42

&lt;211&gt; 183

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 42

gaattctcca tgaaaacaga catatttgat atttaggtgc tttaatggac cctgaaaaga 60  
aattagattg attcatttga agaataaatg tcgggtcccc gccctctaca tggtaaaact 120  
cttccaaatg cttctactta atggaaatgg aaattacctc tcaaaacatt acaaaaacta 180  
atg

&lt;210&gt; 43

&lt;211&gt; 162

8/24

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 43

gaattccgac cactgctgac cgccaggcca cacaccggtt ttnttcagga ggtctcaact 60  
agatgctaag ctccgaagtg gaactccctc aggcactttc tgttctaatt caggaattcc 120  
tcgagcccgg gggatccact agttctagag cggccgccac cg

&lt;210&gt; 44

&lt;211&gt; 189

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 44

gaattctgtg aaataattct cagcccagac ccaaggg(a)tc cacagctcag aaatagggtta 60  
tccagaagtg ttcctaacac tagatgacag tatcccagtg ctccaaacca gcttattact 120  
tggccagaat tcctgcagcc cgggggatcc actagttcta gagcggccgc caccgcggtg 180  
gagctccag

&lt;210&gt; 45

&lt;211&gt; 190

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 45

gaattctctg tctgtcgatt tcagtgattt tagtgctggt cctccacttg agtactagcc 60  
ataggtcttg gcttggcact cccatcccat agccctgtgc accatagctc tgggggtgaac 120  
tcaggcaaaa cgattttcgt cccagcttg ggagcagcag ggttggggac cttggcaatg 180  
gcaatggcag

&lt;210&gt; 46

&lt;211&gt; 266

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 46

gtaatacgac tcaactatagg gcgaattggg taccggggccc cccctcgagg tcgacgggtat 60  
cgataagctt gatatcggt tatectgagc taggctgagc ctttgctctc ctgacctagt 120  
tagttctcat tcaaccctgt gacaagggat gtggggctca gagaacggga gggctcttccc 180  
tcaggtcaca tggccagggc atggagagggc aggacttgaa tccaggtcaa tgtgacccca 240  
gagcctagtg tggaaccg tccttt

&lt;210&gt; 47

&lt;211&gt; 164

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 47

gaattctacc ctgggtagga tagtagctcc cctcaacttt acagcaaata cagctaacct 60  
tgctttacct gcgatcccg ntatttttg ttgaattaga gaaactgagg gaagcagttc 120  
tctacactca ctttaccctt agagccctct acaatcaacc ctgt

&lt;210&gt; 48

&lt;211&gt; 112

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 48

gaattcaaag actgtnagat gtaagcagtg actganacan aggcaatgag atgagaggtg 60  
gaaaggagac caaatgtaaa agacagcaga aacttgagtg gacggtggca ca

&lt;210&gt; 49

&lt;211&gt; 114

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

9/24

&lt;400&gt; 49

gaattctgtt ggctttacct ttaacgtgtc caaaagtgc caattatcat tncgtcnttt 60  
 ngctgctact tggntcaagc cattagatc ccttgctcca ataaactctt tcct

&lt;210&gt; 50

&lt;211&gt; 206

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 50

gaattcccag taacttcctt gtgttggtgtg tgttcaactc acagagttga actttcattt 60  
 acacagagca gatttgaaac actctttttg tggaatttgc aaatggagaa ttcctgcagc 120  
 ccgggggagc cactagttct agagcggccg ccaccgcggg ggagctccag cttttgttcc 180  
 ctttagcgag ggttaattgc gcgctt

&lt;210&gt; 51

&lt;211&gt; 169

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 51

ccccccctcg aggtcgacgg tatcgataag ctggatatcg gcaacttctc gctctgtcct 60  
 cacataggga aagaggaagc tggtgccttc ctcttacaag agcactaatc tcacatgggt 120  
 gtttaccctc atgactttat ctaaaccctaa ttatctttca aagaatcta

&lt;210&gt; 52

&lt;211&gt; 141

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 52

gaattcttgt tttcagtgaa aatttagata atttatctca ggaattcctg cagcccgggg 60  
 ttccactag ttctagagcg gccgccaccg cggtagagct ccagc-t-tg ttccctttag 120  
 ttaggg-taa ttcgcgcttg c

&lt;210&gt; 53

&lt;211&gt; 203

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 53

gaattctata tatttcccct cttttcctga ctcttcagtg acaatcctaa gaccgtgcta 60  
 ataacagaag acagtaatcc ctttttttag ccaaataatt tggaagccat gattttcttt 120  
 gcatatcatg aaagtaccca tgggtgtgga tattgtgggt agaagctttc aagtaaaaaa 180  
 gaactgtcat tcaactgaat tgg

&lt;210&gt; 54

&lt;211&gt; 162

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 54

gaattctagg ccaggcgcca tggttcacac ctgtaatccc agcattttcc cgggaagcca 60  
 aggcaggcag atcacttgag gccaagagtt caagaccaac ctggccaaag gggtgaaatc 120  
 catctctact aaaaatacaa aaattagtcg ggcgcggcgg cg

&lt;210&gt; 55

&lt;211&gt; 193

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 55

gaattctatt tctaggaacg ttctcaaaca agcttaagag caaagtataa aaacgatgtt 60  
 cagcatataa taatatgaaa aaattttgtc ctagacattt tatatgaaaa tgtatacttt 120  
 agagcatgct tcaggaaaaa aagaaagaaa aattaatcct gggaaatggg tgacattaga 180  
 tacaggcgag tgg

&lt;210&gt; 56

10/24

&lt;211&gt; 169

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 56

gaattctgct tttatgagaa gtcagctgaa tgctatggaa aggagtatag agagtggctt 60  
 aaaagtttca ggcaagttca caccaaaact tgcattctaa cctccctgaa cctgtgggtct 120  
 agaagggacc tatcagcaag atgataacca aaaatgtcta gaatctgag

&lt;210&gt; 57

&lt;211&gt; 141

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 57

gaattctaga gaacaatccc tactgacttc acacacaact taagaaatgc aagtaaaggg 60  
 ccgggcgcgg tggcccagca cctgtaatcc cagtactttg ggagcctaga ggcagggtgg 120  
 cattggaagt caggagttca a

&lt;210&gt; 58

&lt;211&gt; 183

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 58

gaattctctg atgttttagtt aggtatgacc tacagttaaa ggctttgctg cattccttac 60  
 gttttagagg tttctctccg gtatgactac ttcgatgtcg agtaacggac gttgaattac 120  
 gataaaaggc tttgccacat tctttgcatt tatagggttt ttctccagta tgaattccag 180  
 cag

&lt;210&gt; 59

&lt;211&gt; 185

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 59

gaattctatc aatgtcaatt aaatccagtt gatggatggc cataatttta aatctatttta 60  
 cattttgggg tatttttttaa aataaaaatct gtgattatct atcttttaaat gaatgcctta 120  
 gatcattcac attaaagtga ttgttggtgt agttgtgttc atgtatacca tacttataac 180  
 tgttt

&lt;210&gt; 60

&lt;211&gt; 163

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 60

gaattctact aaaacttttag aaaagaaatt aacaccaatt ctcaaactat ttcagaaaat 60  
 tgaaaaggag aagcctctcc caactaattc tatgaatcca gcattacccc ttacaaaaac 120  
 cagacaaaga tgaaacaaaa taataagaag aaggaactct ggg

&lt;210&gt; 61

&lt;211&gt; 103

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 61

atttccctg ctgggtgtgt ccagagatcc tttctggcta gtctgctagc actgcatgtg 60  
 tcnaccagca tctcaacctc acactagctg caacacttgg cca

&lt;210&gt; 62

&lt;211&gt; 144

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 62

cctctccaaa aagaaaatct ctgccattct atgtacactg gctgcatgaa gatgtatgtn 60  
 tatgaattag cctgcatgtc tgggtccac cctgcacatg ctaacattcc tttccctccc 120

11/24

catacgagtc caaaaaaact atgc

&lt;210&gt; 63

&lt;211&gt; 173

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 63

tcagtcttca ggtgatattg aaatggaggc tgtaagggtt taataatata ggtttcaaaa 60  
 ccaggcagca acacatacta gccatgtaaa acttgagcta cccaacccg cctgggtgtt 120  
 gcttagtcct tctttgaaaa ttaaaattct gttctctgga aatagtattt agg

&lt;210&gt; 64

&lt;211&gt; 150

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 64

ttacaacctt tatgagattg gtgccattat caccattttc agacatgaaa aatacagcac 60  
 acacagttta agtaatatgc tgaattcctg cagcccgggg gatccactag ttctagagcg 120  
 gccgccaccg cgggtggagct ccagcttttg

&lt;210&gt; 65

&lt;211&gt; 159

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 65

ccagtaactt ccttgtgttg tgtacattca actcacagag ttgaacgttc ccttagacag 60  
 agcagatttg aaacactctt tttgtgcaat tggcaagtgg agatttcaag cgctttaagg 120  
 tcaatggcag aaaaggaaat atcttcgttt caaaactag

&lt;210&gt; 66

&lt;211&gt; 73

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 66

tcccaatcct tcctgtgact caagcctctg ctcattaggt atcctaggac aatattatgc 60  
 tgtntctatc aga

&lt;210&gt; 67

&lt;211&gt; 87

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 67

agccagagcc aagctctctc actctgcaga gaagcctcag tctttagaag acagttcagc 60  
 tttatccaga attcctgcag ccggggg

&lt;210&gt; 68

&lt;211&gt; 110

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 68

tatgatcaac aaatatatct tacaacatga ggggtgcaata agatgagaaa ggttcgagag 60  
 tgtttatctt tagcaaatac atactatcgc gctcaaggta agtnttcaag

&lt;210&gt; 69

&lt;211&gt; 111

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 69

Tattgtgccc agagataatt gtctcgcagt cagagcattc tatgtntttt tctgtcgttg 60  
 attaataaag agggtttcag gcttcctgt aggaaaatgt ctaaagcata a

&lt;210&gt; 70

&lt;211&gt; 138

12/24

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 70

attcatttat accctcattt attcatccaa cagccattca ataagcgtct gtgttcagcc 60  
 atgctctgac actgattgan ttctgcagc cgggggatcc actagttcta gagcggccgc 120  
 accgaggtgg acgtcagc

&lt;210&gt; 71

&lt;211&gt; 144

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 71

caggttgatg aagaaacgga tattagtgc atgaagaaca gtcgcgtctc tgtcagctgg 60  
 tcatttttta tatgtcagag actgtcgaat ttctattgcg tttcaactaa ttacctcagt 120  
 ttgttaaaac tgaatatgaa ttcc

&lt;210&gt; 72

&lt;211&gt; 113

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 72

ntctatctag ttttatatga aganatcacg tatcacacga tggaccctaaa gaggtccaaa 60  
 tatccacttg cagttctaca aaaagagtgt ttcaaacag cactatcaag agg

&lt;210&gt; 73

&lt;211&gt; 97

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 73

tacattcttt ttcttaacta tccaccacct cccctcaaaa ttttaacagc atccagcctc 60  
 acaaaactca gatcttcct gtgtacagtt ccacttt

&lt;210&gt; 62

&lt;211&gt; 143

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 74

gacaattcca ttcaatacca attgatgatg tttatttttg attccatttg atgatgatta 60  
 cattcgattc catttcatca tgattccatt cgattccact cgatgattcc attcgattcc 120  
 attcaatgat tattccactt gag

&lt;210&gt; 75

&lt;211&gt; 98

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 75

aatgataat atagtcaatt caggaaagan aatcatccta anatttcgta ttatgattag 60  
 aagtgttaatt tcgctganat agaaaatttc tcattatt

&lt;210&gt; 76

&lt;211&gt; 88

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 76

agctgacatt gtaatttaat aaagctaagg ataaaacttc tgggtttttt gtttattgag 60  
 cccgctgact agaagagata agagatgg

&lt;210&gt; 77

&lt;211&gt; 101

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 77

13/24

ctctggttgt tgtcaggttt ttnattatta gattccagaa ttcctgcagc ccgnggatc 60  
 cactagttct agagcggccg ccaccgcgtt ggagctccag c

&lt;210&gt; 78

&lt;211&gt; 109

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 78

aaggttacag tgagctatga tccaccactg cactccagca tgggcaacaa agcgagaccc 60  
 agtatttaga tttatttgtt aatagccagg catatttgta catgcgtgt

&lt;210&gt; 79

&lt;211&gt; 121

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 79

ctatatcaca tactttattg tcttgtacag tttgctttgt ttcattgtgtg gataccctga 60  
 nttcctgcag cccgggggat ccactagttc tagagcggcc gccaccgcgg tggagctcca 120  
 g

&lt;210&gt; 80

&lt;211&gt; 144

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 80

ctatgagtgg cctccaagga gcattagatt agaagggtggc tggaggggtgg atattttcat  
 acacagagac aaagctcccc atcccacaac agatccagag tctgtnttgg accacagggg  
 aggaaggccc ttctccagga ttct

&lt;210&gt; 81

&lt;211&gt; 160

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 81

ttaggagagg tcagagtggg ctggagcagc cagggtgagcc tttgttgtgt aggcaggagg 60  
 aagaagcagt ggattttgag ttgaggacgg aatttgagag ggggagggaa aaggaaggga 120  
 atccgcagag gcagagctga ctgcactcgt gagggagggg

&lt;210&gt; 82

&lt;211&gt; 164

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 82

atacaaattg cagactgcag cgttctgaga aacatctttg tgatgtttgt attcaggaca 60  
 gagagttgaa cattccctat catagagcag gttggaatca ctcttttgt agtatctgga 120  
 agtggacatt tggagcgctt tcaggcctat gttgaaaag gaaa

&lt;210&gt; 83

&lt;211&gt; 164

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 83

ttgtggttct agattttatg gtctcttttt tatttttcat tttttgagac caagtttcac 60  
 tcttggtgcc cggctggagt gcagtgcgc gatcttggct caccgcaacc tctgcctcca 120  
 ggattcaagc gattcgctg cctcagcctt actgagtagc tccc

&lt;210&gt; 84

&lt;211&gt; 141

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

14/24

&lt;400&gt; 84

tagttccagc. tataccactt tctagccttc ttgattttgc tgaactgaga gtcagaagag 60  
 atatgtntct aggttatttc caatcattat gccatctcgg aagtggcagg ggtgctatac 120  
 tagactgaga caaatacccc a

&lt;210&gt; 85

&lt;211&gt; 72

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 85

cttctaaaat tctatggtag tatganaggc tacacaaaag tntttggacc tgatacaaat 60  
 attataaatg at

&lt;210&gt; 86

&lt;211&gt; 135

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 86

tcataaaaata accattaata tttcactttc gttttttatc ctaacctttt tctaacacat 60  
 aaacatattc attgggagggt cgaggcgggc ggatcacgag gtaggagatc gacgaccatc 120  
 cggtaaaagg tgaaa

&lt;210&gt; 87

&lt;211&gt; 107

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 87

cagccccaaag aatgtctgga gcccgagtat catctggcag ccaccctcgg agaagggggg 60  
 gatccactag ttctagagcg gccgcaccgc ggtggagctc agctttt

&lt;210&gt; 88

&lt;211&gt; 109

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 88

ccatgtggaa gcacagctat aaggctcttt ctatgaacca gaaagcaggc tttctctaaa 60  
 caccgaatct gccaatgcct tgatcttggg tttccagat tccgaacta

&lt;210&gt; 89

&lt;211&gt; 112

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 89

cagggactta atcaacgcaa gcttatgacc cgcacttact ggggaattcct cgttcatggg 60  
 gaataattgc aatccccgat ccccatcacg aatgggggtc aacggggttac cc

&lt;210&gt; 90

&lt;211&gt; 125

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 90

acctgtaatc ccaactactc tggaggctga ggcaggagaa tggcatgaac ccgggagggtg 60  
 gaggatgcag tgagccaaga ttgtgccact gaactctage ccaggcaaag gtgagagact 120  
 tgatc

&lt;210&gt; 91

&lt;211&gt; 130

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 91

cacttaagat tgtatctttn actctatgag ttattttctca ataaaaagta aaattnannn 60  
 tactaataat taganatnat cttctctaga atgagcattn aatgagtcag ctagagaggc 120

15/24

gacttaactg

&lt;210&gt; 92

&lt;211&gt; 104

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 92

cagcccttac attgtgtctg tgacccagtg ttaaattgaga cccaggtcaa gagacaactc 60  
 ttggctggt ctaggatatt ntataanaata gatctatcac tctg

&lt;210&gt; 93

&lt;211&gt; 122

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 93

cgtcagctca gcagcctgac aatttgaact cagtagtacc acattgccac atggctatgt 60  
 tcaggggtta atacttctta gcaagaaat agagaccaat ctctgtgac actttaact 120  
 tt

&lt;210&gt; 94

&lt;211&gt; 76

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 94

cacatggatg gggaggcctt ccaatcatgg cagaaggcaa aggagaaagn nagcacatct 60  
 tacaggcagc aggcaa

&lt;210&gt; 95

&lt;211&gt; 109

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 95

cagccccagc atggcaggaa tatntntngc attgggttct ttggaggagg aaagtacgtn 60  
 ctgagagnag gcaattntc gccgctgggt taaggctttn natgaccga

&lt;210&gt; 96

&lt;211&gt; 112

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 96

cagccccgaa ttatgtatta anagttatcc tcaccaagaa agacaagggt tctgtagttc 60  
 tctaactca tatccctata tanntntnac tgtgcagtat ccagacaatg aactccttc 120  
 agagagaatt ctatggccac atctctaa

&lt;210&gt; 97

&lt;211&gt; 122

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 97

taaaactttg ttataagaga tggaagggtt taaatatata nntctaannn ntntagttt 60  
 aaagaattcc aaacttaaac atcttcagta gacttgacat tgtatttcgn atactctatg 120  
 tc

&lt;210&gt; 98

&lt;211&gt; 88

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 98

ctttaaatat ataaactcca aggcagtaca agtctggnnn nnnnnnagct acccaatatc 60  
 tgataaatat gaatacctaa taatagac

16/24

<210> 99  
 <211> 105  
 <212> DNA  
 <213> Artificial Sequence  
 <400> 99  
 tcctaaaact ctccctcacc agcatcccaa tttaaagcct tggtccttgc tcctccctct 60  
 agggggatcc actagttcta gagcggccgc caccgcggtg gagct  
 <210> 100  
 <211> 86  
 <212> DNA  
 <213> Artificial Sequence  
 <400> 100  
 cgccactatg ctccagctact tnnntnttgt tttgtagaga tgggtgtttc accatgttgc 60  
 ccagactgat cttanactcc tgggtc  
 <210> 101  
 <211> 156  
 <212> DNA  
 <213> Artificial Sequence  
 <400> 101  
 gaccctccac tgatttncca tottgaccac tgcctaccca attactgtnc cagtcgaaac 60  
 ctgggcgcca tgtgacgact ctctccctct ctacagctac acaaccgcgc tgtgctgtcg 120  
 ggtcttatcc tttccacca gtccatggct tggctc  
 <210> 102  
 <211> 173  
 <212> DNA  
 <213> Artificial Sequence  
 <400> 102  
 cagcccccata aaattaacca tcacactagg tgatgtcttt nttttttgag agcaagtctt 60  
 gctcgtcacc aggotggaat actgtggtgg gatctcagct cactgcacct ccacctcctg 120  
 ggttcagca attgttctgc ctccagcctgg gggatccact agttctagag cgg  
 <210> 103  
 <211> 191  
 <212> DNA  
 <213> Artificial Sequence  
 <400> 103  
 cagccccctt agaaatagct cttcgagaca ctccctggtag acatgatccc aggtttgctg 60  
 agcagctgtg caaccatgcc tcaggcctga ggaacagctc gcaggccact ctgtctggta 120  
 ataccccagg cggccaagc aatagatctg catcccaggg ggatccacta gttctagagc 180  
 ggccgccacc g  
 <210> 104  
 <211> 191  
 <212> DNA  
 <213> Artificial Sequence  
 <400> 104  
 bagccccctt ggctcagtct ggaaaggcaa gacaactaga aggtgggggg cttccagggc 60  
 ataggtagat tcanaaatgt actgattggc acttccttga ccgagttatt aactaaagac 120  
 ctggaatcaa tagaaaggaa tgtctgggtt aaggtaaggg ctatggggga tccactagtt 180  
 ctagacggcc g  
 <210> 105  
 <211> 103  
 <212> DNA  
 <213> Artificial Sequence  
 <400> 105  
 ttctnagana tttnacatca nattaaccca ctganaaact tgcnaactct cactttcaac 60  
 gtctgancgg naattttaat tggnggatcc actagttcta gag

17/24

<210> 106  
<211> 173  
<212> DNA  
<213> Artificial Sequence  
<400> 106  
cagccccctt attaactcac cccttgcat tgttcaaccc tagntaataa agtcactcag 60  
gtgtacttct ganaattgaa gttaaattatt tttcaccaca gagctgaacc attacagagg 120  
<210> 107  
<211> 111  
<212> DNA  
<213> Artificial Sequence  
<400> 107  
tcataanata accattaata tnnnnntnnn nnnnnnatcc taacattttt ctaacacata 60  
aacatattca cttgggaggc cgaggcgggc ggatcacgag gtcaggagat c  
<210> 108  
<211> 70  
<212> DNA  
<213> Artificial Sequence  
<400> 108  
caatttacac tctggcaggg ggaganagga naatttntnc tgtnggaagg gggagttgng 60  
gnaggaggcc  
<210> 109  
<211> 104  
<212> DNA  
<213> Artificial Sequence  
<400> 109  
caaanactaa natacctctn agtctggnta gacactttca ctggataggt agaggccttt 60  
nctacaggnt atnanaaggc caccacagtc atttntccc ttct  
<210> 110  
<211> 68  
<212> DNA  
<213> Artificial Sequence  
<400> 110  
tcatgtagge ctnttcacga ttttnnaaat catttnagtn acatccaagt nnnntngct  
gttaatca  
<210> 111  
<211> 107  
<212> DNA  
<213> Artificial Sequence  
<400> 111  
cagccccaat caagggtgt tttcfaatct ctttgtataa aannctagat tctgtattag 60  
tctgtttctca ggctgctaataa aaagacatac ccaaggctgc gtacttt  
<210> 112  
<211> 173  
<212> DNA  
<213> Artificial Sequence  
<400> 112  
tggaagaaa aactatgtac atctgagacg ctgcagctgg taccctactt ctttcagagc 60  
atcaacaggt taagtgtgga ttcattccaca cctcagacc cgtgaccgta g  
<210> 113  
<211> 121  
<212> DNA  
<213> Artificial Sequence  
<400> 113  
gaatctctac accaaccctc tottaacctc tacagttcaa atccaaatct caaactttct 60

18/24

gatttgaatt tgcttatccc tatgtaattc taacttaaga cctaagacca aaagggaaac 120

c

&lt;210&gt; 114

&lt;211&gt; 103

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 114

tcttccagct aaatagttgc agagtcagag tagaagccag ctctcctgac aatatatttn  
atgatattct agagaatatc cctagaatca ttcctaggta ctc

&lt;210&gt; 115

&lt;211&gt; 86

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 115

tgtcattggt aatttatgtg agaacacaaa gcatccaaca ntanngatt ctgcatttcg 60  
accaacagat agtttctcat cgaaga

&lt;210&gt; 116

&lt;211&gt; 120

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 116

cagccccgtt tgttttacct ttngottttn atgtgcttct ctaacanttn agggcgaact 60  
aaccagcatg aggnttgtn ctgcttgatt ttnaaccatc ctttctgtc tgtacacagg 120

&lt;210&gt; 117

&lt;211&gt; 95

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 117

ccctccctga gtctntntaa cagcagcact gccccaaac ctnanttggt tcccctgata 60  
gccaggtacc cggnttctnt ngcagtgcta actgt

&lt;210&gt; 118

&lt;211&gt; 109

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 118

tattaannnn nctaactna atattntngt ntctcgggga acagaaaagc ctgaggagaa 60  
ggagagatag tnggaatntc tagttnttgg agcagtcaga acacacata

&lt;210&gt; 119

&lt;211&gt; 79

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 119

cctgtattac agaaccaagg attaaaaact cagcagatgt gtaatgagtt ttaaataatt 60  
acaatatnnn nnntataaa

&lt;210&gt; 120

&lt;211&gt; 83

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 120

tagttgatcc gnnagcccat gcgataccgc gnnngcgctc gnngccgang ggggatccac 60  
tagttctaga gcggccgcca ccg

&lt;210&gt; 121

&lt;211&gt; 177

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

19/24

&lt;400&gt; 121

cgtttgttt acctttcact tttaatgtgc tttctctaac aattaagggc gaactaacca 60  
gcatgaggat tgtgtctgct tgattttaaa ccattcctta atgtctgtac acaggaaatg 120  
ttatcaacaa gagatgattc ttggggggatc cactagggtc tagagcggcc gccaccg

&lt;210&gt; 122

&lt;211&gt; 103

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 122

ttatagttaa anacanagat ggtaacagcc ctttcccaa gcagacctcc ttcttgacctg 60  
gnaaagggt gttaccatct ttgttttaaa ctataaacta taa

&lt;210&gt; 123

&lt;211&gt; 139

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 123

caagaagggt ggtgctggca ttttcttctg gtgagggcct caggaagctt tcaatcatgg 60  
cagaaagtga gaggagagta ggcattgtac anagagagac atgccttcat tctcggggga 120  
tccactagtt ctgagcgg

&lt;210&gt; 124

&lt;211&gt; 103

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 124

cattaaagcc tttnttagga aatctnttta aacaacagaa taaaagggt gactttnaga 60  
tagaactttn ngtagacatct ccagtttctg gttacatgat att

&lt;210&gt; 125

&lt;211&gt; 103

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 125

cagagagaga gaaacanaca gncagagaga gagagaccac anagagagag agagagagaa 60  
gatcagacag agaaaganag agacagagac agacannnag aca

&lt;210&gt; 126

&lt;211&gt; 113

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 126

cagccccaga gagagagaaa cagacaggna gagagagaga gacacagaga gagagagaga 60  
gagaagatca gacagagaaa gagagagaca gagacagaca nanagaatag aga

&lt;210&gt; 127

&lt;211&gt; 181

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 127

actcatttta tgaggccaga atcatcctga taccaaaacc tggcagagac acacacacac 60  
aaaagaaaat ttcaggccaa tatccctgat aaacattgat gcaaaaatcc tcaataaaat 120  
actggcaaac tgaatccagt agcacatcaa aaagctgggg gatccactag ttctagagcg 180  
g

&lt;210&gt; 128

&lt;211&gt; 150

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 128

20/24

cccgcccat gtagctctca ggtggcccat gacaccacac tggtcttctt tcctctccat 60  
 gggtcacacc ggccacctag tcagtcctaa cgtcggaacc tggatacctc cattgctggt 120  
 gctggaccgg tcactgtttt ggatattttc

&lt;210&gt; 129

&lt;211&gt; 173

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 129

tcctaagtgt cccaacagtg gagcacatta ttcaggaact taaagatata atcgcagaac 60  
 agcacctcca agctcgtaaa tgcttatctc ggtaaccctc agtcatggga caatcaaatt 120  
 caatacatcg gaggaacacc atgctgacgg gggatccact agttctagag cgg

&lt;210&gt; 130

&lt;211&gt; 187

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 130

ctatagaagc tccttctata ttngccttat nncactcatg gcggtagtft gaattcagat 60  
 ctctgggtca ttattatcc atggaaagtt aatttgagat gttggaactt ttaaacagtg 120  
 tttgtttatt gtgctaata ccatctgtta ctaaatttga ttgggggatc cactagttct 180  
 agagcgg

&lt;210&gt; 131

&lt;211&gt; 170

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 131

cagatatttg tagatatgcc gcgttatttc tgagggtctt gttctgttcc attgatctat 60  
 atctctgtct ttggtaccag taccatgctg ttttggttac tgtagccttg tagtatagtt 120  
 tgaagtcagg tagcatgatg cctccggggg atccactagt tctagagcgg

&lt;210&gt; 132

&lt;211&gt; 147

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 132

tctctaaaat tctatggtag ttgaaaggct acacaaaagt ttttgacact gatacaaata 60  
 ttataaatnn nnnnnnnnt gtntgatttg atactccatg taaaactctt cctaattggtc 120  
 tcgggggatc cactagttct agagcgg

&lt;210&gt; 133

&lt;211&gt; 123

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 133

tattaaaaat acaaaaaatt agccgggagt ggtggcacgc gcctgtagtc ccagctactc 60  
 gggaggctat ggcaggaaaa tcccttgaac ctgggaggcg gaagttgcag cgagaagaga 120  
 tca

&lt;210&gt; 134

&lt;211&gt; 164

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 134

ctgtctttca agtttcaggc ttgaaagtga aaaataatgc ataatttacg gaagctattg 60  
 gtgtgaaaat atccaagaga agaattgagga atagtggagt gaaataaaca ggagattagg 120  
 tagatagaaa ttgactattg ggggatccac tagttctaga gcgg

&lt;210&gt; 135

21/24

&lt;211&gt; 193

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 135

cttaaatatgg tatgcttaat gtagtgagct aaacaaaata acaatgtgta tagtattgtn 60  
 taanataccc cacttccaat tgtttaaagt gcaaaacaaa ttatatgttt ganagttaag 120  
 gtggaataaa tgaagattaa atgatatgaa ctactcagaa aacaggtagg gggatccact 180  
 agttctagag cgg

&lt;210&gt; 136

&lt;211&gt; 233

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 136

cattgattaa atttattgat gcattgtaaa tttgaatcaa tatctattaa tcccaagctg 60  
 gagtgcagtg gcgccatctc agctcactgc gacctctgcc tcccgggttc aagcaattct 120  
 catacctcag cctcccgagt agctggaacc acaggcatga gccacccatgc ccggctagtt 180  
 acagggtttt cctatgctat ccaggctgga gtgcagtggtt ggatccacta gtt

&lt;210&gt; 137

&lt;211&gt; 194

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 137

ctaaaggatc cttcaactct gtgagttgaa tacacacaa acaaggaagt tactgagaat 60  
 tattctgtct agcataatat gaagaaatcc cgtttccaac tgaagacctc aaagaggctg 120  
 aatatccact tgcagacttt acagagtgtt tcctaactgc tctatgagag ggggatccac 180  
 tagttctaga gcgg

&lt;210&gt; 138

&lt;211&gt; 155

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 138

cagcccggaa aatatagggc aaattttttt attttgctgt ttggtgactc caccactttt 60  
 gcaacagtac ttttggtgcc cattaaccaa attactttga tttctttgtg taaatattat 120  
 gaagaccaga accttttgag ggggatccac tagtt

&lt;210&gt; 139

&lt;211&gt; 200

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 139

ctagacaaaa gcccacacac ctggatgaat cagtgcagag ttacgtcaca aagtcctttt 60  
 aggcatatcc tagacaaggg ttacatcact tggatgatca gtgcagagat atgtcacaa 120  
 gccactgtag ggtgagccta gaaaagagtt tcatgaccta ggtgatcagt gcagaggggg 180  
 atccactagt tctagagcgg

&lt;210&gt; 140

&lt;211&gt; 169

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 140

ctgtgactgt gcctatagaa gaaaaaaaa atagcgtgta atctcagcac tctgggaggg 60  
 caaagcaggg gggatcactt gaggccaaga gttcaagacc agcctggcca acaaagcgaa 120  
 accttctctc tactaaaaat acaaaaatta gccgggcatg gtggcactc

&lt;210&gt; 141

&lt;211&gt; 211

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

22/24

&lt;400&gt; 141

agggccacca gctggtgaat cctgccccac cagctcagag ctcttcccat tcatggagta 60  
 tatcatagga gactggattt ccaaagctgc atggagcttc attcctgaac tggtcaccct 120  
 gtgtctagtc ttgtttttctc aatccatcct gctctccagc agcctcaata cttctaaat 180  
 tgtccggggg atccactagt tctagaggcg g

&lt;210&gt; 142

&lt;211&gt; 195

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 142

cacagacatc ctgtgccacc tcattcactc tcacatgcct ctgaggtgag ggggataaca 60  
 gcactagtat catttgatac tgatacaaat cggctctaaa tattgtgggg atgctggtgg 120  
 tgttattgct ggactccatt acacaagttt catgagccag tgaaaatcac tgtgggggat 180  
 ccactagttc tagag

&lt;210&gt; 143

&lt;211&gt; 199

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 143

Cagccctaaa gtataataaa aaaaaatttt ttaaagaatc ttcacaaaag aactctgaaa 60  
 tgtcagcatg agcagatgat gaagtatcat aggaatccat tttttgctgt atttcttatt 120  
 taatagagaa agaaatttca tatgctgtaa tatgtttcca attggaaatt aaaatctgat 180  
 aggggggatc cactagttc

&lt;210&gt; 144

&lt;211&gt; 178

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 144

cagccccctt gtaacaatat gggctgttct agctgtaatt cacctctgga gccatcagaa 60  
 tcctcctggt aaaaatggcc ctaatatcaa acacagaggc cactgctagt taaactttat 120  
 aaatcgaaca agaaatcata tgatataatc agataagagc ctgggggatc cactagtt

&lt;210&gt; 145

&lt;211&gt; 158

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 145

cagccccctg ggctcaagca atctgcccac ctgggcctcc ccaagtgctg ggattacagg 60  
 tgtgagtnac tgncccggc cagcctgtc tatttgtcag aaacagggag ttggggcaac 120  
 cctggtgcca agatatggg gggatccact agttctag

&lt;210&gt; 146

&lt;211&gt; 184

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 146

cagccccctg taaataactt tcgaagttaa gaaagctaatt ggtatatcat caggcaccaa 60  
 taaaactatc ttgagatttg acaatgccaa ctgaaaaatt tcttctgcaa ggcagagcca 120  
 gttacctttt ataatatcaa tttagattca cacaaagaca ttctcagggg gatccactag 180  
 ttct

&lt;210&gt; 147

&lt;211&gt; 219

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 147

cagccccacg ggtggtaatc ntggctgctt tntgcacttc cacataaagt gcttctneta 60  
 cgctgtctcc actcagaaac aattacaaca gtatgtgaag cagtattgaa aacttcnnaa 120

23/24

gctgcacaca gattcattga aaagggcaga agcctcatta atactagagt ctgaggcaca 180  
 acctatgacc gaacactggg ggggatccac tagttctag

&lt;210&gt; 148

&lt;211&gt; 185

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 148

cagccccag aaaaaaaga gcaagaggat ggggctgaaa aaattactca aagaaataat 60  
 ggctaaaaag tactcaggtt tatcaaaaga caagtctgca gaactaagaa gatgacaaaa 120  
 tccttgatcat agacagaatg tgtgtttccc aaacttcgtg tggtggggg atccactagt 180  
 tctag

&lt;210&gt; 149

&lt;211&gt; 129

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 149

cagccctgca gtatttagtt ttctattcct gagttagttc acttaggaaa atgggtctcta 60  
 gctccatcca tgaagcacca aatccctcca gcccagtagc aaggagacag aatttttact 120  
 ctgtctctg

&lt;210&gt; 150

&lt;211&gt; 74

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 150

cagcccctct tttctgctcc taaggaagat gcattctcag gatacaggan nnnnggggga 60  
 tccactagtt catg

&lt;210&gt; 151

&lt;211&gt; 95

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 151

cagccccatt taacctggag aggaataccc taaggattct tggaggctga aagacttaaa 60  
 atttgaggaa tgaaagaata gcaaggggtga atcgg

&lt;210&gt; 152

&lt;211&gt; 144

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 152

cagccctgca gtatttagtt ttctattcct gagttagttc acttaggaaa atgggtctcta 60  
 gctccatcca tgaagcacca aatccctcca gcccagtagc aaggagacag aatttttact 120  
 ctgtctctga tgagaagagt gtac

&lt;210&gt; 153

&lt;211&gt; 138

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 153

cagccctgat agttacctta ctgttttgct atgaccatac tctacataga gtatttagat 60  
 taaatggagg aatgagaata tgagattagt ttctcatatt ctgtgatca tgacaggacc 120  
 tgagattctg cacagatg

&lt;210&gt; 154

&lt;211&gt; 139

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

24/24

&lt;400&gt; 154

cagccccgct gtttctaaag tcagtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgagag 60  
agagagagag agagagagcg tatgcatgtg tgtctgcatg tgtgtgtgcg cgcgtacatt 120  
tgggagacgg tgtgtaagt

&lt;210&gt; 155

&lt;211&gt; 133

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;400&gt; 155

cagcccggaa aggtaataca agtaagatga ttataaacia atgcttttaa acagagtcaa 60  
tgaaaccagt ctgtttgtga ggccaaggc tccatatttt acaactcagt ctgtaaggat 120  
agctatgtat ctg

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**